



Mi Universidad

Ermin de Jesus Reyes Lopez

Parcial 2°

Imagenología


Gerardo Cancino Gordillo

Medicina Humana

Cuarto semestre


Comitán De Domínguez, Chiapas, a 27 de abril de 2025

Neumotorax



Radiografía simple de tórax, vista anteroposterior, es una buena radiografía ya que no se encuentra muy penetrada y se logra apreciar los tejidos blandos, como también los cuerpos vertebrales aunque se observa un poco rotada con desvío de la vía aérea hacia la derecha, a nivel de tejidos blandos no se encuentra ninguna anomalía, y en estructuras óseas no se observan lesiones líticas ni blásticas, pero a nivel pulmonar en esta radiografía observamos la retracción del pulmón hacia el hilio pulmonar, se observa con un aumento de la densidad, relacionado a un neumotórax, también se observa, en la porción periférica del hemitórax afectado, la ausencia de vasos pulmonares, que se extiende hasta la periferia de la pared torácica.

Derrame pleural




Radiografía simple de tórax, en vista antero posterior, es una buena radiografía ya que se alcanzan a apreciar los cuerpos vertebrales y no se encuentra muy penetrada, a nivel de tejidos blandos y grasa no se encuentra ninguna anormalidad, y en estructuras oseas no se observan lesiones liticas ni blásticas, a nivel pulmonar no se alcanza a apreciar el borde costofrenico y cardiofrenico izquierdo a causa de un aumento de la densidad que se aprecia cubriendo 2/3 del pulmón izquierdo que relaciono con la densidad liquido a espensas de un derrame pleural en el pulmón izquierdo, porque se encuentra muy bien delimitado

Linfoma



Radiografía simple de torax, en vista postero anterior, es una radiografía de mala calidad ya que se encuentra demasiado penetrada no se logra observar los cuerpos vertebrales y el signos de la silueta no se aprecia con claridad, a nivel de tejidos blandos y grasa aparentemente no muestra ninguna anormalidad, y las estructuras óseas no se logran apreciar, lo que si se logra ver es una masa a nivel del mediastino, con ligera lobulación de los bordes derechos del mismo, con relación a crecimiento ganglionar

Neumonía



Radiografía simple de torax, en vista anteroposterior, es una buena radiografía un poco penetrada pero permite observar los tejidos blandos de una manera, a nivel de tejidos blandos y grasa no se encuentra ninguna anomalía, y en estructuras óseas no se encuentran lesiones líticas ni blásticas, lo que se logra apreciar en esta radiografía es una zona de consolidación focal relacionado a una neumonía

Masa Mediastínica



Radiografía simple de tórax, en vista postero anterior, la radiografía es de buena calidad se logra apreciar la diferenciación de algunas estructuras sin embargo se encuentra un poco penetrada, a nivel de tejidos blandos y grasa no se encuentra ninguna anomalía y en estructuras óseas no se aprecia ningún tipo de lesión ni lítica ni blástica, en donde podemos apreciar una masa anormal en el tercio superior del tórax, que muestra un efecto íntimo con estructuras mediastínicas. A causa de la presencia de la masa hay desplazamiento de la tráquea. Y se encuentra firmemente con bordes bien delimitados