UNIVERSIDAD DEL SURESTE LICENCIATURA
EN MEDICINA HUMANA CAMPUS COMITAN DE DOMINGUEZ

Tema: diagrama de flujo de dermatitis atópica

Nombre: Gerardo Pérez Ruiz

Grupo: A

Grado: 8

Materia: inmunoalergias

Docente: Dr. Adrián Espino Pérez

Comitán de Domínguez Chiapas a 31 de mayo de 2025

Dermatitis atópica

Es una enfermedad crónica pruriginosa de la piel, la cual se presenta frecuentemente en niños, se caracteriza por cursar con remisiones y exacerbaciones

se presenta en 3 fases

La fase escolar o infantil se presenta a los 2 a 12 años edad, la dermatosis predomina en pliegues antecubitales, cuello, muñeca

Fase de adulto se presenta posterior a los 13 años de edad se presenta la afeccion en la flexion de las extremidades cursa con eccema y liquenificación

Fase del lactante, inicia durante los primeros meses de edad predominando en mejillas y respetando el triángulo de fiatov

Se clasifica de acuerdo a la severidad de las lesiones si son eritematosas, edema/ papulación, xerosis, excoriación, liquenificacion, exudación o costras

<25 DA leve

25-50 DA moderada

>50 DA severa

El diagnostico laboratorial se solicita el test cutáneo de prick test y el test de parche como Rajka y hanifin

Diagnostico por clínica

Prurito, A la palpación se detecta piel seca, Aspecto ojerosos , Piel escamosa

Una DA leve se indican emolientes por 26 dias de 250 a 500 gr

PX con brotes frecuentes se indica esteroides tópicos de acuerdo a la gravedad de baja, media alta potencia

Como seguimiento se puede indicar vit B12 más cromoglicato de sodio tópico

Inidicar ATB profiláctico en px con brotes recurrentes. Dicloxacilina de 250 mg

Conclusiones

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, caracterizada por brotes recurrentes de prurito intenso, sequedad cutánea, enrojecimiento, eccema y engrosamiento de la piel. Su presentación clínica varía en función de la edad del paciente y de la severidad del cuadro, la cual puede clasificarse en leve, moderada o severa. Esta clasificación depende de la extensión de las lesiones, la intensidad del prurito y el impacto en la calidad de vida del paciente. En los casos leves, se observan áreas pequeñas de piel seca, con enrojecimiento y prurito ocasional, mientras que los casos moderados y severos implican lesiones más extensas, exudativas o liquenificadas, con picor persistente que puede alterar el sueño y llevar a infecciones secundarias.

Conclusiones

Guía de práctica clínica mexica. Tratamiento de dermatitis atópica evidencias y recomendaciones. Recuperado 01/06/25