Mi Universidad

Mapas mentales

Damaris Yamileth Espinosa Albores

Parcial IV

Fisiopatología III

Dr. Gerardo Gordillo Cancino

Licenciatura en Medicina Humana

Cuarto Semestre grupo "C"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de julio de 2025.

COLITIS ULCEROSA

Enfermedad inflamatoria intestinal crónica que afecta exclusivamente al colon y al recto, caracterizada por inflamación continua y superficial de la mucosa intestinal.

Definición

Cuadro clínico

- Diarrea con moco y sangre.
- Tenesmo (urgencia para defecar).
- Dolor abdominal tipo cólico, más frecuente en el cuadrante inferior izquierdo.
- Fiebre, fatiga, pérdida de peso en casos graves.
- Manifestaciones extraintestinales: artritis, uveítis, eritema nodoso.

Diagnóstico

- Colonoscopia con biopsia: mucosa friable, edematosa, úlceras superficiales; inflamación continua.
- Laboratorio: anemia, PCR y VSG elevadas, hipoalbuminemia.
- Serología: p-ANCA positiva en algunos casos.
- Coprocultivo para descartar infecciones.
- Diagnóstico diferencial con enfermedad de Crohn.

Incidencia: 9–20 casos por cada 100,000 personas/año.

Más frecuente entre los 15 y 40 años.

Predomina ligeramente en hombres.

Mayor prevalencia en países desarrollados y zonas urbanas.

Asociada a antecedentes familiares y factores ambientales.

Epidemiología

Respuesta inmunitaria anómala frente a la microbiota intestinal.

Inflamación limitada a la mucosa y submucosa del colon.

Comienza en el recto y se extiende de forma continua hacia el colon (proctitis → pancolitis).

Infiltrado inflamatorio con neutrófilos, criptas distorsionadas y úlceras superficiales.

Fisiopatología/Patogenia

Tratamiento

Farmacológico

- Aminosalicilatos (mesalazina) → primera línea.
- Corticoides (prednisona, budesonida) para brotes.
- Inmunomoduladores (azatioprina, ciclosporina).
- Biológicos (anti-TNF: infliximab, golimumab).

No farmacológico

- Dieta según tolerancia.
- Apoyo psicológico.
- Cirugía (colectomía) en casos refractarios o con displasia.

Prevención

- No hay prevención primaria conocida.
- En pacientes con enfermedad extensa y de larga duración, vigilancia con colonoscopia regular para prevenir cáncer colorrectal.

ENFERMEDAD CELÍACA

Definición

Trastorno autoinmune crónico causado por la ingesta de gluten (proteína del trigo, cebada y centeno), que provoca inflamación y daño en la mucosa del intestino delgado en personas genéticamente susceptibles.

Cuadro clínico

- Forma clásica (gastrointestinal) — diarrea crónica, pérdida de peso, distensión abdominal, malabsorción
- Forma atípica — anemia ferropénica, osteoporosis, infertilidad, aftas, fatiga.
- Forma silenciosa — sin síntomas, hallazgos en estudios.

Diagnóstico

- Serología:
 - Anticuerpos anti-transglutaminasa tisular (tTG-IgA).
 - Anticuerpos antiendomiso (EMA).
- Biopsia intestinal — atrofia de vellosidades.

Tratamiento

- Farmacológico
 - no hay fármacos curativos actualmente.
 - Suplementos vitamínicos y minerales si hay deficiencias.
- No farmacológico
 - Dieta estricta sin gluten de por vida.
 - Educación nutricional, seguimiento médico-nutricional.

Prevención

- No hay prevención conocida.
- En personas en riesgo (familiares de primer grado), se recomienda vigilancia con serología.
- Introducción del gluten en lactantes de forma gradual y con lactancia materna puede ayudar, pero no previene completamente.

Epidemiología

- Afecta aproximadamente al 1% de la población mundial.
- Más frecuente en mujeres
- Mayor prevalencia en Europa y América del Norte.
- Puede presentarse en cualquier edad, incluso en adultos mayores.

Fisiopatología/Patogenia

Ingesta de gluten — fracción gliadina pasa al epitelio — modificada por la enzima transglutaminasa tisular (tTG) — presentación al sistema inmune (HLA-DQ2/DQ8) — respuesta inflamatoria — atrofia de vellosidades intestinales.

ENFERMEDAD DE CROHN

Enfermedad inflamatoria intestinal crónica de causa autoinmune que puede afectar cualquier parte del tracto digestivo (de la boca al ano), caracterizada por inflamación transmural y discontinua (lesiones en parches).

Definición

Afecta tanto a hombres como mujeres, con inicio habitual entre los 15 y 35 años.

Más prevalente en países industrializados (Europa, América del Norte).

Incidencia en aumento en países en desarrollo.

Mayor riesgo en personas con antecedentes familiares.

Epidemiología

Alteración de la respuesta inmunitaria del huésped frente a la microbiota intestinal.

Infiltrado inflamatorio que afecta toda la pared intestinal (transmural).

Formación de úlceras profundas, fistulas, abscesos y estenosis.

Asociada con genes como NOD2/CARD15 y factores ambientales (dieta, tabaquismo).

Fisiopatología/Patogenia

Cuadro clínico

Dolor abdominal crónico (especialmente en fosa iliaca derecha).

Diarrea crónica (a veces con sangre), fiebre, pérdida de peso.

Fístulas anales, abscesos perianales.

Manifestaciones extraintestinales: artritis, eritema nodoso, uveítis.

Diagnóstico

Endoscopia (colonoscopia + biopsia): lesiones en "piedra de empedrado", úlceras profundas, afectación salteada.

Imagenología: enterorresonancia, TAC abdominal. enterorresonancia, TAC abdominal.

Laboratorio: PCR, VSG elevadas; anemia, hipoalbuminemia.

Serología: anticuerpos ASCA (no diagnósticos, pero útiles).

Diagnóstico diferencial con colitis ulcerosa.

Tratamiento

Farmacológico

Aminosalicilatos (uso limitado).

Corticoides (budesonida, prednisona) para brotes.

Inmunomoduladores (azatioprina, metotrexato).

Biológicos (anti-TNF: infliximab, adalimumab).

Antibióticos en complicaciones infecciosas.

No farmacológico

Dieta individualizada según tolerancia.

Apoyo psicológico, control del estrés.

Cirugía en casos de estenosis, fistulas, abscesos o fracaso terapéutico.

Prevención

No existe prevención primaria.

Evitar el tabaquismo (empeora el curso).

Detección temprana en personas con antecedentes familiares.

Monitoreo regular para detectar complicaciones como cáncer colorrectal.

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE (SII)

Definición

Trastorno funcional gastrointestinal caracterizado por dolor abdominal crónico y alteración en el hábito intestinal (diarrea, estreñimiento o ambos), sin evidencia de daño estructural.

Epidemiología

- Afecta al 10–15% de la población mundial.
- Más frecuente en mujeres.
- Inicio común entre los 20–40 años.
- Impacto importante en calidad de vida y productividad.

Fisiopatología/Patogenia

Multifactorial

- Alteración de la motilidad intestinal.
- Hipersensibilidad visceral.
- Disbiosis intestinal.
- Factores psicosociales (estrés, ansiedad)
- Inflamación de bajo grado y activación inmune en algunos casos.

Cuadro clínico

- Dolor o molestia abdominal recurrente.
- Cambios en frecuencia o forma de las evacuaciones.
- Distensión o hinchazón abdominal.
- Puede clasificarse como: con predominio de diarrea, estreñimiento o mixto.

Diagnóstico

Clínico, según criterios de Roma IV

Exclusión de enfermedades orgánicas (colonoscopia, estudios de laboratorio si hay signos de alarma).

Tabla 1. Criterios de Roma IV

Dolor abdominal recurrente mínimo 1 día por semana, durante los últimos 3 meses, con síntomas iniciales de mínimo 6 meses antes del diagnóstico y asociado por lo menos a dos de los siguientes síntomas:

Alteraciones en la evacuación	Cambios en la frecuencia de evacuación	Cambios en la apariencia o forma de las heces

Dolor abdominal al menos 1 día por semana en los últimos 3 meses, relacionado con la defecación y cambios en la frecuencia o forma de las heces.

Tratamiento

- Farmacológico**
 - Antiespasmódicos (butilioscina, mebeverina).
 - Laxantes suaves (en SII-E).
 - Antidiarreicos (loperamida en SII-D).
 - Antidepresivos tricíclicos o ISRS (modulan dolor).
- No farmacológico**
 - Dieta baja en FODMAPs.
 - Fibra soluble.
 - Reducción del estrés, psicoterapia cognitivo-conductual.
 - Actividad física.

Prevención

- No existe prevención definitiva.
- Modificar dieta, evitar alimentos irritantes, buena salud mental y control del estrés pueden reducir aparición de síntomas.