



Mi Universidad

Cuadro comparativo

Carlos Adrián Álvarez López

Parcial II

Propedéutica semiología y diagnóstico físico.

Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez.

Licenciatura en medicina humana.

Cuarto semestre grupo C.

Comitán de Domínguez, Chiapas a 07/marzo/2025

F. metabólicas

Facies
Hipotiroidea

- Asociada al hipotiroidismo
Rostro hinchado y redondeado; piel seca, pálida y gruesa; expresión poco expresiva o apática; labios y nariz engrosados; Ojos hinchados o con edema periorbitario; cabello seco



Hipertiroidea

Expresión de alerta o mirada brillante; Ojos prominentes (exoftalmos, en enf. graves); piel fina y sudorosa; Pérdida de peso evidente en la cara, con facciones marcadas; Aumento de la actividad muscular facial (aspecto ansioso o inquieto).



Cushingoidea

Cara redonda o "en luna llena"; rubicundez o enrojecimiento facial; acumulación de grasa en la región facial y supraclavicular; Piel fina y con tendencia a hematomas; hirsutismo.

Cushingoidea



Rasgos faciales toscos y prominentes (crecimiento exagerado de mandíbula, nariz, pómulos y frente); Macroglosia; Cejas gruesas y prominentes con pliegues cutáneos profundos. Agrandamiento de manos y orejas.

Acromegálica



Pérdida de peso y grasa subcutánea; ojos hundidos y pómulos marcados; piel seca y arrugada; aspecto de debilidad generalizada

Caquética



F. cardiovascular.	Facies	Mitral	Px con estenosis de v. mitral. Robor malar con tono azul-violáceo; piel pálida en el resto de la cara; labios ligeramente cianóticos y expresión de fatiga 
		Cianótica	Coloración azulada o violácea en labios, nariz, mejillas y orejas; piel fría y sudorosa; labios, lengua y g intensamente morados en casos severos; Puede haber dedos en palillo de tambor. 
	Immunológica	En Heliotropo	Eritema violáceo en párpados superiores, con edema; puede extenderse hasta la frente y mejillas; se asocia con debilidad muscular progresiva.

Facies neurológicas

Lúpica

Eritema en alas de mariposa; puede haber lesiones escamosas; foto sensibilidad; alopecia y lesiones orales.



Parkinsoniana

Postro inexpressivo o "cara de máscara"; poca movilidad facial; boca entreabierta y babeo; cejas poco elevadas y mirada fija.



Myasténica

Ptosis palpebral facial bilateral; debilidad facial progresiva; dificultad para sonreír; Disartria.



Parálisis facial

Asimetría facial (un lado de la cara sin mov.);
dificultad para cerrar un ojo; desviación
de la boca hacia el lado sano; ausencia
de arrugas en la frente.

