

Garcia Aguilar Paola Montserrat
Materia: Inmunoalergias
8• Grupo: B

¿Como preescribir un opioide?

TIPO DE OPIOIDE

Dolor leve por cancer

Opioides leves

Dextropropoxifeno
Tramadol +
Paracetamol

Clorhidrato
de tramadol

Dolor moderado/
severo por cancer

Opioides
potentes

morfina
Buprenorfina
Pentazosina

Dosis

Debe ser **ajustada** en cada caso,
en **particular**, con aceptable nivel
de efectos colaterales.

horarios
regulares

Medicación
constante

Ruta de administración

1.Oral

- Facilidad de administración,
- independencia costo

4 a 6 horas

- Morfina
- Codeína
- Oxycodona
- Hidromorfona

2.Alternativa
de elección

- Subcutanea

6 a 8 horas

- Buprenorfina
- Tramadol
- Tramadol de liberación prolongada

Dosis rescate

10% de la dosis
diaria total.

Vías de administración

Intravenosa

Eficaz alterna a
la oral.

De elección paciente
está hospitalizado

subcutánea

elección en paciente
ambulatorio .

más utilizada en
CuidadosPaliativos .

indicación de vías parenterales

Náusea y
vomito persistente.

Disfagia grave o
problemas de
deglución.

Delfrium,
confusión,
estupor u otras
alteraciones
mentales.

Requerimiento
rápido de
aumento de la
dosis para
analgesia.