Universidad del sureste

Campus Comitán

Licenciatura en Medicina Humana

Síntesis

Cristel alcala ochoa

8“B”

Medicina basada en evidencia

Dr. Alonso Díaz reyes

Síntesis

Un ACV es una interrupción repentina del flujo sanguíneo al cerebro, ya sea por una obstrucción (isquémico) o por una hemorragia (hemorrágico). Es una emergencia médica que puede causar daño cerebral permanente si no se trata rápidamente.

No modificables: edad, sexo, genética, raza. **Modificables**: hipertensión, colesterol alto, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, consumo de drogas, fibrilación auricular.

Los síntomas aparecen de forma repentina:

- Debilidad o entumecimiento en la cara, brazos o piernas (especialmente en un lado).
- Confusión, dificultad para hablar o entender.
- Pérdida de visión, mareo, pérdida de equilibrio.
- Dolor de cabeza intenso sin causa aparente.

Dependiendo del área afectada del cerebro, puede causar:

- Parálisis o debilidad.

- Problemas cognitivos y de memoria.
- Dificultades en el habla y comprensión.
- Trastornos emocionales y dolor persistente.
- **Isquémico** (80%): obstrucción del flujo sanguíneo por coágulos.
- **Hemorrágico** (20%): rotura de vasos sanguíneos.
- **Ataque isquémico transitorio (AIT)**: síntomas temporales pero es señal de un riesgo mayor

Tratamiento Depende del tipo de ACV:

- **Isquémico**: tPA (medicamento trombolítico), anticoagulantes, eliminación de coágulos, cirugía.
- **Hemorrágico**: control del sangrado, clipaje de aneurismas, embolización.
- Rehabilitación física, emocional y cognitiva es esencial para la recuperación.

Bibliografía

National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (n.d.). *Accidente cerebrovascular: Esperanza en la investigación*. National Institutes of Health