



Universidad Del Sureste
Licenciatura en Medicina Humana



Nicole Yuliveth García Guzmán
Dra. Berenice Solís
Análisis de la decisión medica
Octavo semestre
Grupo: "B"

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas 10 de abril del 2025.



Enfermedades hipertensivas del embarazo



	DEFINICION	FACTORES DE RIESGO	TX
Enfermedad hipertensiva crónica	HTA mayor o igual a 140/90mmHg Antes del embarazo, antes de 20 SDG o hasta la sexta semana postparto, asociada/no a proteiunuria	<ul style="list-style-type: none"> ANTECEDENTE DE PREECLAMPSIA EN EMBARAZO PREVIO MENOR DE 34 SEM. <ul style="list-style-type: none"> ENF. AUTOINMUNE NULIPARIEDAD <ul style="list-style-type: none"> EDAD 	Primera línea: metildopa Segunda línea: bloqueadores de canales de Ca Prevencion: AAS 80-150 mg antes de la 16va SDG
Hpertensión gestacional	Hipertensión que se presenta después de la semana veinte de gestación, proteinuria negativa. En el postparto (12 semanas) cifra tensionales normales		Contraindicado: IECA, ARA II PRIMERA LINEA: Labetalol SEGUNDA LINEA: Metildopa, hidralazina, Nifedipino, metoprolol
Preeclampsia	Cifras tensionales 140/90 mmhg, proteiunira +300mg/24h, Cr 30mg/mmol, en la gestante con 20 DG o hasta 2 semanas post parto		No farmacologico resolución del embarazo Farmacologico Metildopa y labetalol
Preeclampsia con datos de severidad	Cifras tensionales 160/110 y sin		Resolución del embarazo Nifedipino/hidralazina/Labetalol
Eclampsia	Complicación de la preeclampsia, acompañada de síntomas neurológicos, que incluye: convulsiones (eclampsia), hiperreflexia, cefalea, alteraciones visuales (fotopsia, escotomas, ceguera cortical, vasoespasmio retinal),		Manejo inicial;soporte vital, protección de V.A, oxigenación Sulfato de magnesio régimen ZUSPAN dosis carga 4g i.v, dosis de mantenimiento 1-2gr i.v/hr
Sx de HELLP	Hemólisis, Enzimas hepáticas elevadas y Plaquetas (bajas) es una presentación particular de la preeclampsia severa		protocolo de Mississippi dexametasona, antihipertensivos, y sulfato de magnesio Control PAS Nacimiento inmediato
Hpertensión crónica con preeclampsia sobreagregada	desarrollo de preeclampsia o eclampsia en una mujer con hipertensión crónica preexistente.		Administrar betametasona Sulfato de magnesio para la profilaxis convulsiva

Referencias bibliográficas

Detección, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Hipertensivas del Embarazo. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, IMSS; 2017.