Algoritmos

Llenifer Yaquelin García Díaz

DERMATITIS ATOPICA

Parcial 3°

INMUNOALERGIAS

Dr. Adrián Espino Perez

Licenciatura en Medicina Humana

8° semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas. A 01 de junio del 2025.

Dermatitis Atópica

-Enfermedad crónica pruriginosa de la piel.
- Se caracteriza por cursar con remisiones y exacerbaciones.

Se asocia frecuentemente a niveles elevados de IgE

•Etiologia: asociada a la predisposición genética. Factores ambientales e inmunitarios.

Factores de riesgo predisponentes.
Enfermedades predisponentes: Se ha asociado a
asma, rinitis alérgica, alergia a alimentos; así como a infecciones recurrentes en la piel.
Geneticos: alteraciones en el gen de la Filagrina
Factores ambientales:

Clasificación

¿edad, fase?

Fase lactante: Inicia durante los dos primeros meses de edad, predominando en mejillas y respetando el triángulo central de la cara

Se caracteriza por eritema y pápulas. Puede diseminarse a piel cabelluda, pliegues retroauriculares y de flexión, nalgas y tronco;

Fase infantil:. Se presenta de los 2 años a los 12 años de edad.

predomina en los pliegues antecubitales, huecos poplíteos, cuello, muñecas, párpados y región peribucal. Se caracteriza por eccema y liquenificación.

Fase adulto: Se presenta después de los 13 años de edad

Se manifiesta en superficies de flexión de las extremidades, cuello, nuca, dorso de manos y genitales. Cursa con eccema y liquenificación

Diagnostico

Clínico

- Eritema
- Papulas
- Eccema
- liquenificación

Laboratoriales

Recuento de IgE en suero
Pruebas cutaneas

Medidas terapéuticas

No farmacológico

-educación a los padres en identificación de sintomas.
-dieta baja en lácteos.

Farmacológico

-omalizumad
-tracolimus
-talidomina
-IgE intravenosa

Bibliografias

- (S/f). Gob.mx. Recuperado el 1 de junio de 2025, de https://imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/706GER.pdf