



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Facultad de Medicina Humana



CARRERA EN
LIC. EN MEDICINA HUMANA

MATERIA
Fisiopatología

DOCENTE
Dra. Axel Guadalupe Ceballos Salas

Fichas

Integrantes:

- **SANTIAGO REYES JUAN PABLO**

28 DE JUNIO DEL 2025

Choque séptico.

Tipo más frecuente de choque vasodilatado, se relaciona con una infección grave.

Manifestación: • Hipotensión, • Piel caliente y • ruborizada

Tx:

- consumo temprano de antibiótico
- control de vías respiratorias
- ventilación mecánica (si es necesario)

Rayter

Síndrome de Zollinger-Ellison

Es una alteración rara causada por un tumor secretor de gastrina.

Dx:

- concentraciones elevadas de gastrina sérica y ácido gástrico basal

Tx: control de secreción de ácido gástrico mediante fármacos IBP

- Resección qx si es indicada como maligno.

Rayter

Insuficiencia Hepática

Destrucción masiva o súbita del hígado

- Manifestaciones: • Alteración hemática, • cutánea, • síndrome hepatorenal; • Alteración endocrina

Tratamiento:

- NO consumo de alcohol
- suministrar hidratos de carbono y calorías
- Reducir la producción de amoníaco

Rayter

Choque anafiláctico

Reacción alérgica sistémica más grave.

Manifestaciones: • cólicos abdominales, • Aprensión,
• sensación de calor, prurito, • urticaria, • TOS.

Tratamiento:

- vigilancia cardiorrespiratoria
- Hielo
- interrupción inmediata del agente causal
- Antihistamínicos y corticosteroides.

Rayter

Embolia pulmonar

Se genera cuando una sustancia transportada en la sangre se aloja en una arteria pulmonar.

Manifestaciones: • Dolor torácico, • Disnea, • incremento de la frecuencia cardíaca.

Dx: signos y síntomas, medición de gases sanguíneos, estudio de trombólisis venosa, troponina.

Tx:

Tratamiento trombolítico con activador plasminogénico tisular recombinante.

Rayter

Bibliografía:

Fisiología 10ed. Porth