



Escuela de
**MEDICINA
HUMANA**



EPIDEMIOLOGÍA

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

FACULTAD DE MEDICINA

ENCUESTA Y VARIABLES DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

CATEDRATICO: DAYAN GRACIELA ALBORES

ALUMNOS: PEREZ SÁNCHEZ MÍA ESTHER, PÉREZ RUIZ ABNER IVÁN, SANTIAGO
REYES JUAN PABLO, TORRANO DÍAZ GILDA Y VELASCO ABARCA CRISTIAN
LEONARDO.

**LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025
BERRIOZABAL, CHIAPAS**



CARTILLA NACIONAL DE SALUD

NIÑAS Y NIÑOS
DE 0 A 9 AÑOS
CARTILLA DE VACUNACIÓN

ESQUEMA DE VACUNACIÓN



¿SE RECONOCE INDÍGENA?: SI ☐ NO ☐

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

No. AFILIACIÓN/MATRÍCULA/EXPEDIENTE: _____

UNIDAD MÉDICA: _____

CONSULTORIO No. ☐ ☐ ☐ _____

DATOS GENERALES

SEXO _____

DOMICILIO: _____
CALLE Y NÚMERO

TIPO DE VIVIENDA _____ SERVICIOS BÁSICOS _____

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

LOCALIDAD DÍA MES AÑO

PERSONA RESPONSABLE:

PARENTESCO _____

Ocupación _____ Escolaridad _____

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Vacuna	Enfermedades que previene	Dosis	Edad de vacunación oportuna	Fecha de aplicación	
BCG	Tuberculosis meningea y milar	Única	Al nacer		
Hepatitis B	Hepatitis B	Única	Al nacer		
Hexavalente DPaT+VPI+ Hib +HepB	Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomelitis, Hepatitis B y enfermedades graves por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b, como neumonía y meningitis	Primera	2 meses		
		Segunda	4 meses		
		Tercera	6 meses		
		Refuerzo	18 meses		
DPT	Difteria, Tosferina y Tétanos	Refuerzo	4 años		
Rotavirus	Diarrea por Rotavirus	Primera	2 meses		
		Segunda	4 meses		
Neumocócica conjugada	Neumonía, meningitis y otras enfermedades graves causadas por neumococo	Primera	2 meses		
		Segunda	4 meses		
		Refuerzo	12 meses		
SRP (Triple viral)	Sarampión, Rubéola y Parotiditis	Primera	12 meses		
		Segunda	18 meses**		
			6 años***		

* De conformidad con los Lineamientos Generales de Vacunación vigentes.

** Nacidos a partir de julio de 2020 se les aplicará segunda dosis de SRP a los 18 meses.

*** Nacidos antes de julio de 2020 se les aplicará segunda dosis de SRP a los 6 años.

◆ Esquema sujeto a los lineamientos vigentes según tipo de vacuna contra la COVID-19.

◆◆ Refuerzo en niñas y niños con alguna comorbilidad. A fin de disminuir las oportunidades perdidas de vacunación, el intervalo mínimo podrá ser de 4 meses.

Vacuna	Enfermedades que previene	Dosis		Edad de vacunación oportuna	Fecha de aplicación	
Influenza	Neumonía por virus de la influenza A y B	Primera		A partir de los 6 meses		
		Segunda		A las 4 semanas de la primera dosis		
		Dosis Anual (cada temporada invernal)		1 año		
				2 años		
				3 años		
				4 años		
		Niñas y niños de 5 a 9 años con factores de riesgo		Primera		
				Segunda		
				Dosis anual		
COVID-19 ♦	Formas graves de la COVID-19	Esquema primario	Primera	A partir de los 5 años		
			Segunda			
			Tercera			
		Niñas y niños con factores de riesgo Refuerzo♦♦		12 meses después de la última dosis		

O tras vacunas	Nombre de la vacuna	Número de la dosis	Fecha de la aplicación	Instituto de vacunación
Otras vacunas				

ENCUESTA

CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO: _____

INSTITUCIÓN DONDE ACUDE A VACUNACIÓN: _____

¿SE LE HA NEGADO ALGUNA VACUNA?:

SI

NO

¿CUÁL? _____

SI ES EL CASO, ¿CUÁL ES LA CAUSA POR LA QUE LA NEGARON?

SI ES EL CASO, ¿CUÁL ES LA CAUSA DEL NO HABER ASISTIDO A VACUNACIÓN?

ECONÓMICAS

GEOGRAFICAS

ADMINISTRATIVAS

CREENCIAS

¿TIENE ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN?

SI

NO

¿CUÁL? _____

¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE LA VACUNACIÓN?

SON DAÑINAS

SON EFICIENTES

SON DEFICIENTES

OTRAS

¿A TENIDO PRESENCIA DE ENFERMEDADES PREVIAS O INMUNOSUPRESIÓN?

SI

NO

¿CUÁL? _____

¿A TENIDO REACCIONES ADVERSAS A VACUNAS?

SI

NO

¿CUÁL? _____

VARIABLES

Variables sociodemográficas:

- Edad del infante (meses / años).
- Sexo del infante (masculino / femenino).
- Nivel educativo y ocupación de los padres o tutores del infante.
- Tipos de vivienda (urbana / rural).
- Servicios básicos (completos / incompletos).

Variables relacionadas con el esquema de vacunación:

- Vacunas recibidas.
- Número de dosis aplicadas según la edad.
- Cumplimiento del esquema de vacunación (completo / incompleto).
- Edad de aplicación de cada vacuna (a tiempo / tarde).
- Institución donde acude a vacunación (IMSS, ISSSTE, SSA, privado).

Variables sobre barreras y acceso a la vacunación:

- Centro de salud más cercano.
- Disponibilidad de vacunas en la institución donde acude a vacunación.
- Dificultades de acceso (económicas, geográficas, administrativas, creencias).
- Percepción de los padres del infante sobre la vacunación (Beneficiosa, riesgosa, es mito).

Variables clínicas del infante:

- Antecedentes de enfermedad prevenible por vacunación (Si / No, ¿Cuál?).
- Presencia de enfermedades previas o inmunosupresión (Si / No, ¿Cuál?).
- Historial de reacciones adversas a vacunas (Si / No, ¿Cuál? Cefalea, mialgia, artralgia, emesis, pirexia).