

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Trabajo: Cuadro Sinóptico

Materia: Microbiología

Docente: Dr. Miguel Ricaldi

Alumna: Xiomara Yaneska Nuñez

Grado: 2 Semestre

GIARDIASIS LAMBLIA


Etiología

Se debe a la ingestión de quistes del parásito presentes en agua o alimentos contaminados, o por contacto fecal-oral.

Que es la Giardiasis?

La infección por Giardia es una infección intestinal caracterizada por cólicos estomacales, hinchazón, náuseas y episodios de diarrea acuosa.

Ciclo biológico



Taxonomía

Es un género de protozoos flagelados, clasificado dentro del reino Protozoa (ahora generalmente considerado un reino basal de eucariotas).

Síntomas

- Diarrea
- Gases y distensión abdominal
- Dolor o calambres abdominales
- Náuseas
- Fatiga
- Pérdida de apetito y pérdida de peso

Causas

- Beber agua contaminada
- Alimentos contaminados
- Contacto persona a persona

Factores de riesgo

- Niños.
- Personas sin acceso a agua potable segura.
- Sexo anal.

Clasificación

En la clasificación de los protozoos de Levine (1980), el género Giardia se incluye en el phylum Sarcomastigophora, subphylum Mastigophora, clase Zoomastigophorea, orden Diplomonadida, familia Hexamitidae que incluye un único género: Giardia.

Tratamiento

Involucra medicamentos antiparasitarios como el metronidazol, tinidazol o nitazoxanida

Medicamentos

El metronidazol es el medicamento más comúnmente recetado, generalmente por 5 a 7 días. El tinidazol, en una sola dosis.

Prevención

- Purificación de agua
- Lavar y desinfectar alimentos
- Relaciones monógamas
- Mantener boca cerrada en piscinas, ríos, etc.

