



Mi Universidad

LESIONES PRIMARIAS

Luis Alberto López Abadía

Segundo Parcial

Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico

Dra. Karla Sofia Lopez Gutierrez

Medicina Humana


Cuarto Semestre Grupo B

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de abril del 2025

LESIONES PRIMARIAS


Una **MACÚLA** es una área plana circunscrita, con cambio de coloración de la piel, que mide menos de 1 cm de diámetro.

Ejemplo: Lentigo, efélide (peca)




Un **PARCHE** es un área plana circunscrita, con cambio de color de la piel, que mide más de 1 cm de diámetro.

Ejemplo: Vitiligo




Una **PAÚPULA** es un pequeño abultamiento sólido de la piel que mide menos de 1 cm de diámetro.

Ejemplo: Verrugas, liquen plano, dermatitis atópica en fase aguda.



Una **PLACA** es una gran elevación de piel más plana, a veces formada por pápulas que se unen.


Ejemplo: Psoriasis



LESIONES PRIMARIAS


Un **NO'DULO** es un abultamiento sólido de piel, de más de 1 cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.

Ejemplo: Dermatofibroma, lipoma




Una **PÚSTULA** es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.

Ejemplo: Acné, folliculitis




Una **VESÍCULA** es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide menos de 1 cm de diámetro.

Ejemplo: Varicela, herpes S.




LESIONES PRIMARIAS


Una **AMPOLLA** es una elevación circunscrita de la epidermis que contienen líquido transparente y mide más de 1 cm de diámetro.
Ejemplo: Pénfigo vulgar, quemadura de segundo grado.



Un **HABOÍN** es una lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico; también se le denomina "roncho" o "urticaria". Las ronchas suelen durar menos de 24h.
Ejemplo: Urticaria.



Una **EROSIÓN** es la pérdida de epidermis formando una excavación húmeda, lisa y brillante, secundaria a la rotura de una vesícula, puede variar el tamaño.
Ejemplo: Áreas de fricción, ruptura de vesículas.



LESIONES PRIMARIAS


Una **ÚLCERA** es la pérdida de la epidermis y de dermis, cóncava y formando un cráter de tamaño variable, exudativa y de color rojo o rojizo azulado.

Ejemplo: Úlcera venosa, Úlcera por presión




Una **PETEGUIA** es una mancha (sin bulto), con forma de punto, de color rojizo o violáceo y que no desaparecen cuando las presionamos. Suelen medir más de 2 mm.

Ejemplo: Trombocitopenia, Fiebre hemorrágica



La **PÚRPURA** es una lesión cutánea o en las mucosas que se manifiesta como manchas o parches de color púrpura. Se produce cuando vasos pequeños sanguíneos se filtran y sangran bajo la piel. Suelen medir de 2 mm a 1 cm.

Ejemplo: Vasculitis, púrpura de Henrich - Schönlein.



Una **EQUIMOSIS** es un moretón pequeño causado por la fuga de sangre de los vasos sanguíneos rotos en los tejidos de la piel o las membranas mucosas. miden más de 1 cm.

Ejemplo: Traumatismo, coagulopatías.

