



Tipo de lesiones

María Fernanda Monjaraz Sosa

Segundo parcial

Semiología

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Medicina humana

Cuarto semestre grupo B

Lesiones cutáneas primarias

- **Macúla:** es un área plana circunscrita, con cambio de coloración de la piel, que mide **menos de 1 cm de diámetro**.



- **Pancho:** es un área plana circunscrita, con cambio de color de la piel, que mide **más de 1 cm de diámetro**.



- **pápula**

Es un pequeño abultamiento sólido de la piel que mide **menos de 1 cm de diámetro**.



- **Plicea**

Es una gran elevación de piel más plana, a veces formada por pápulas que se unen.



-: Nódulo:

Es un abultamiento sólido de piel, de más de 1 cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia los capas más profundas de la piel.




-: Pústula:

Es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.



-: Vesícula:

Pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide menos de 1 cm de diámetro.



-!- **Ampolla**
Elevación circunscrita de la epidermis
que contiene líquido transparente y
mide más de 1 cm de diámetro



-!- **Hombón**
Lesión circunscrita y abultada
que consiste en edema dérmico
también se le denomina urticaria.

Erosiones

Lesiones cutáneas que aparecen como desgastes en la piel, en la capa más superficial. Pueden dejar una especie de excavación.



Úlceras

Es una lesión abierta que se forma cuando se destruyen las capas superficiales de la piel.



Pelequias

Son puntos redondeados del tamaño de una cabeza de alfiler que se forman en la piel. Se producen por un sangrado, que hacen que los puntos sean de color rojo, marrón o morado.



;- Purpura

La purpura ocurre cuando pequeños vasos sanguíneos dejan escapar sangre bajo la piel.
Mide entre 4 y 10 mm de diámetro



;- Equimosis

Mancha de coloración violácea, azulada o amarillenta en la piel o en tejidos subcutáneos.
También llamado "moretón" o "hematoma".

