



Mi Universidad

Lesiones primarias

Nombre: Montserrath Juvenalia Guzman Villatoro

Cuarto Parcial

Materia: Propedeutica, semiologia y diagnostico fisico


Dra. López Gutierrez Karla Sofia

Medicina Humana

Cuarto Semestre Grupo B


Mácula

- Cambio de color de la piel sin alteraciones en la textura o relieve.
- No palpable, sin bordes elevados.
- Menor de 1 cm de diámetro.
- Ejemplo: pecas, manchas de rubéola y sarampión.




Parche

- Es un área plana circunscrita
- Con cambio de color de la piel (rojo, marrón, blanco, azul).
- Mide más de 1 cm de diámetro
- Puede ser hiperpigmentado, hipopigmentado o eritematoso.
- Ejemplo: vitiligo, melasma, manchas café con leche.




Pápula

- Es un pequeño abultamiento sólido de la piel
- Mide menos de 1 cm de diámetro
- Puede presentarse de forma aislada o agrupada.
- Forma por hiperplasia celular en la epidermis o dermis superficial.




Placa

- Lesión elevada, plana y extensa (>1 cm).
- Puede formarse por la unión de varias pápulas.
- Superficie rugosa o escamosa en algunos casos.
- Ejemplo: psoriasis, queratosis seborreica.




Nódulo

- Es un abultamiento sólido de piel
- Más de 1 cm de diámetro
- Se extiende hacia las capas más profundas de la piel
- Consistencia firme o blanda.
- Ejemplo: lipoma, nódulos artríticos.




Pústula

- Elevación pequeña (<1 cm) con contenido purulento.
- Puede ser estéril o infecciosa.
- Asociada a procesos inflamatorios.
- Ejemplo: acné pustuloso, foliculitis.




Vesícula

- Es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis
- Contiene líquido transparente
- mide menos de 1 cm de diámetro.
- Puede romperse y formar costras.
- Ejemplo: varicela, herpes simple.




Ampolla

- Mayor de 1 cm de diámetro
- Contenido líquido claro o hemorrágico.
- Puede formarse por fricción, quemaduras o enfermedades inmunológicas.
- Ejemplo: ampollas por quemaduras, pénfigo.



Habón (roncha o urticaria)

- Lesión circunscrita y abultada
- Edema dérmico
- Transitoria (dura horas o días).
- Ejemplo: reacción alérgica, picadura de insecto.




Erocciones

- Pérdida superficial de la epidermis.
- No deja cicatriz al sanar.
- Puede ser dolorosa y exudativa.
- Ejemplo: excoriaciones por rascado, dermatitis.



Úlcera

- Pérdida profunda de piel, afectando dermis e incluso capas más profundas.
- Puede exudar líquido o pus.
- Deja cicatriz al sanar.
- Ejemplo: úlcera por presión, úlceras varicosas.



Petequias

- Pequeñas manchas rojas (<3 mm) por sangrado capilar.
- No desaparecen con la presión (signo de diascopía negativa).
- Puede ser signo de trastornos hematológicos o infecciones.
- Ejemplo: meningococcemia, escorbuto.



Púrpura

- Mancha hemorrágica subcutánea mayor que las petequias.

- No desaparece con la presión.
- Puede ser asociada a enfermedades vasculares o hematológicas.
- Ejemplo: púrpura trombocitopénica idiopática.



Equimosis

- Hemorragia subcutánea extensa, comúnmente conocida como "moretón".
- Cambio de color progresivo: rojo → morado → verde → amarillo.
- Asociado a trauma o trastornos de coagulación.
- Ejemplo: golpes, trastornos plaquetarios.



Referencias

- Recuperado de Bates Guía de Exploración Física e Historia Clínica 13ª edición.
- **Cueva, J. (2017).** *Atlas de Dermatología Clínica*. Ediciones Journal.