



Lesiones primarias

Diego Adarcilio Cruz Reyes

Segundo parcial

Propedeutica, Semiología y Diagnóstico Físico

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez


Medicina Humana

Cuarto Semestre


Comitán De Domínguez Chiapas 11 De Abril Del 2025

Date. _____ Page. _____

Macule; Es un area plana, circunscrita, con cambio de coloracion en la piel, que mide menos de 1 cm de diametro.




Parete; Es un área plana circunscrita con cambio de color en la piel, que mide más de 1 cm de diámetro.




Date, Page,


Placa; Es una gran extensión
de piel más plana, a veces
formada por cépteros en su
parte superior.




Pápula. Es un pequeño abultamiento sólido de la piel que mide menos de 1 cm de diámetro.



Nódulo; Es un abultamiento sólido de pisol, de más de 1 cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la pisol.




Pustule: Es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.




Date. _____ Page. _____


Vesícula; Es una pequeña cavidad to circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide menos de 1 cm de diámetro.



Ampolla; Es una elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide más de 1 cm de diámetro.




Abobón; Es una lesión circunscrita y exaltada que consiste con edema dérmico, tensión blanda roscha o urticaria. Los ronches suelen durar menos de 24 hrs.



Erosiones; Pérdida del epitelio
epidérmico o mucoso.



Úlcera; Pordide más profundo
de la epidermis y al menos
de la dermis superior.



Petequias; Focos ponteados de
hemorragia no placentoblas.




Porpora, No blanqueable abonado
> palpable.



Equimato, Áreco
de córpura que



Equimanto, Árvores mais grandes
do pântano que no se branqueiam.



BIBLIOGRAFIAS

- Bickley, L. S. (2021). Bates. Guía de exploración física e historia clínica (13.^a ed.). Wolters Kluwer.