



Notas

Breici del Rocio López Méndez


Propedeutica, semiología y diagnóstico físico

Dra. karla Sofía López Gutierrez

Medicina Humana


Cuarto Semestre grupo B

Mácula: Área plana circunscrita, con cambio de coloración de la piel, mide menos de 1cm diámetro




Date. _____ Page. _____


Parche: Área plana
circunscrita, con cambríos de
color de la piel, mide más
de 1cm de diámetro




Papula: Abultamiento pequeño sólido de la piel, mide menos de 1 cm de diámetro




Placa: Elevación de la piel
(grande) plana, en
ocasiones formada por
pápulas que se unen.




Papula: Abultamiento pequeño sólido de la piel, mide menos de 1 cm de diámetro




Placa: Elevación de la piel
(grande) plana, en
ocasiones formada por
pápulas que se unen.




Nódulo: Abultamiento sólido de la piel, mide mas de 1cm de diámetro, generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.




Pústula: Pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.



Vesícula: Pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis de contenido transparente de $> 1\text{cm}$ de diámetro.




Ampolla: Elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide más de 1 cm de diámetro.



Hábon: Lesión circunscrita
y abultada = edema der-
mico; también denomina-
da "roncha" o "urticaria"

• Ronchas < 24h



Erosiones: Lesiones superficiales en la piel o mucosa en donde hay pérdida de la capa más externa, pero sin afectar las capas más profundas.



Úlcera : Pérdida más profunda de tejido, puede afectar varias capas de la piel o mucosa.



Pelequias: Pequeños puntos rojos o violáceos en la piel, causado por pequeñas hemorragias (sangrado de capilares). Mide $< 2\text{mm}$



Púrpura : Manchas ro-

jizas o moradas más

grandes que las petequias
causadas por sangrado

bajo la piel, mide entre

2mm y 1cm de diámetro.



Equimosis : Zonas extensas de sangrado bajo la piel (moretones), cambian de color con el tiempo y también se deben a la salida de sangre en los vasos, miden mas de 1cm.



Bibliografía:

BICKLEY, L. S., SZILAGYI, P. G., & HOFFMAN, R. M. (2021). BATES: GUÍA DE EXPLORACIÓN FÍSICA E HISTORIA CLÍNICA (13.^a ED). WOLTERS KLUWER. ISBN: 978-84-18257-69-8.