



Cuadro Comparativo

Luis Alberto López Abadía

Primer Parcial

Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico

Dra. Karla Sofia Lopez Gutierrez

Medicina Humana

Cuarto Semestre Grupo B

Comitán de Domínguez, Chiapas a 8 de marzo del 2024

FACIES PATOLÓGICAS

Aspecto facial caracterizado por edema de la cara, especialmente de los párpados, y la palidez de la piel, consecutiva al propio edema. La infiltración edematosa redondea la cara, lo que, con el estrechamiento de la abertura palpebral que determina el edema de los párpados

RENAL



**CAQUÉ
CTICA**

Aspecto facial con palidez y relieves óseos marcados, con cara triste y cansada, con un tinte pardo-grisáceo. En desnutrición y en neoplasias



Aspecto facial con erupción cutánea roja con forma de mariposa sobre las mejillas y la nariz, por lo general, después de la exposición al sol

**LÚPI
CA**



Aspecto facial de la piel con una coloración azulada, que se produce cuando la sangre tiene un bajo contenido de oxígeno

CIANO TICA




PARKINSONIANA



Aspecto facial con característica por inexpressión de la cara, fijeza de la mirada, falta de parpadeo, supresión de la mímica, aspecto grasoso de la cara (cara de pomada) y la boca entreabierta con sialorrea

S. DE CUSHING

Aspecto facial con "cara de luna llena", con redondez facial debido al depósito de grasa, eritema que le da un aspecto rubicundo, piel fina y frágil con tendencia a equimosis y estrías, hipertricosis en mujeres con aumento del vello facial, y presencia frecuente de acné debido al exceso de cortisol



MONGO LOIDE




Aspecto facial que se asocia con el síndrome de Down. Se caracteriza por: Inclinación de los ojos hacia adentro, Pliegues en el ángulo interno del ojo, Puente nasal aplanado, Orejas implantadas bajas, Macroglosia

Aspecto facial con gran desarrollo de la nariz, maxilar inferior, arcos superciliares y cigomáticos, labios y lengua. Hay cejas pobladas y unidas por la parte interna

ACROMEGALÍA




S. HORNER



Aspecto facial por parálisis del simpático cervical, se caracteriza por enoftalmos del lado paralizado, congestión de la conjuntiva y miosis por predominio de la acción del motor ocular común y ptosis palpebral

HIPERTIROIDE

Aspecto facial con mirada fija de verdadero terror, rigidez de la expresión, exoftalmos e intensos cambios vasomotores de la piel de la cara




ANEMICA

Aspecto facial con pérdida del color rosado normal, palidez generalizada que compromete los labios



Aspecto con desfiguración facial con convexidades prominentes y pliegues surcados causados por la infiltración dérmica de la piel, en este caso, con linfocitos T neoplásicos

LEOONINA



BIBLIOGRAFIA

- Verlezza. (2012, November 12). SEMIOLOGÍA DE LA FACIES. Medicina Interna Al Día. Recuperado el 26 de febrero del 2025
- Dr. José Augusto Terceros Pedraza. UDABOL.Cabeza y Cuello. SEMIOLOGÍA Facies. PDF. Recuperado el 26 de febrero del 2025
- Studocu. (n.d.). Facies clinica propedeutica - Facies Facie Febril Facie Hipocrática Facie Tirotoxicata Facie. Studocu. Recuperado el 26 de febrero del 2025.