



Lesiones primarias

Abril Guadalupe de la Cruz Thomas

Parcial 2

PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y DIAGNOSTICO FISICO I

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Licenciatura en Medicina Humana

Cuarto semestre grupo "B"

Comitán de Domínguez, Chiapas, a 04 de abril de 2025

Lesiones primarias

abril 03

1. Mácula


Cambio en la coloración de la piel sin alterar su relieve o grosor. Son alteraciones que no se pueden palpar y que tienen causas variadas.

Características

- No es palpable
- Menor a 1cm
- No altera relieve o grosor de la piel
- Puede presentar diversos colores según su causa
- Causas variadas

Ejemplos

- Máculas lunares
- Lesiones de vitiligo



Erupciones cutáneas

3. Párpalo

Mancha plana y grande que puede ser una lesión cutánea.

Características

- Miden más de 1 cm.

Ejemplos

- Pícos
- Hemangiomas
- Alergias medicamentosas



abril 03

3 Placa

Lesión de la piel palpable, elevada o deprimida. Pueden ser planas o abombadas.

Características

- Pueden medir más de 10mm de diámetro.
- Palpables
- Áreas planas o elevadas.
- Pueden ser grupos de pequeñas protuberancias.

Ejemplos

- Xantomas
- Placas psoriásicas
- Liquefacción



4 Nodulo

Se caracteriza por ser un abultamiento firme que puede estar lleno de tejido o de liquido.

Caracteristicas

- Hasta 1cm de tamaño.
- Palpables
- Dejan cicatriz
- Varian en textura, movilidad y sensibilidad.
- Abultamientos bien circunscritos

Ejemplos

- Quistes
- Lipomas
- Fibromas



5. Pústula

Lesiones cutáneas que aparecen como ampollas llenas de pus. Son frecuentes en cara, cuello, pecho, espalda, etc.

Características

- Mide menos de un centímetro de diámetro
- Pequeñas elevaciones
- Contienen pus.
- Se pueden ser amarillas, pero también, pueden ser blancas, verdes o rojas.

Ejemplos

- Pustulosis palmoplantar
- Pustulos exantemática aguda
- Pustulosis pustulosa



6. Vesícula


Lesión cutánea que se ven como pequeñas ampollas llenas de líquido.

Características

- Miden menos de 5mm de diámetro
- Se rompen fácilmente y liberan líquido.
- líquido color transparente, blanco, amarillo.

Ejemplos

- Quemaduras
- Varicela
- Herpes simple



7. Ampolla

Lesión de la piel que se parece a una burbuja
llena de líquido transparente. Mide $< 1\text{cm}$

Características

- Lesiones elevadas, palpables y circunscritas.
- Más comunes en manos y pies.
- Contienen líquido seroso o sanguinolento.
- Se curan rápidamente, generalmente no dejan cicatriz.

Ejemplos.

- Quemaduras
- Reacciones alérgicas severas
- Medicamentos.



8 Hinchón.

Caracterizado por una elevación de la piel, picor intenso y enrojecimiento.

Características

- Bordes claramente definidos
- Acompañados de prurito
- Lesiones transitorias
- Color similar al de la piel o rojizas
- $< 5 \text{ mm}$

Ejemplos.

- Picadura de insecto
- Fármacos
- Trastornos autoinmunitarios.



9. Erosiones

Lesión que se produce cuando se degradan las capas superficiales de la piel.

Características

- Áreas abiertas de la piel.
- Resultado de un rascado intenso
- No dejan cicatriz
- Mide $\leq 1\text{cm}$. de diámetro.

Ejemplos

- Cortes
- Raspaduras
- Inflamación.



10. Úlcera.

Herida abierta que se produce cuando se pierden las capas superiores de la piel.

Características.

- Área enrojecida, descolorida o oscurecida.
- Dura o cálida al tacto.
- Puede haber dolor, mal olor y descomposición.
- Mide desde varios milímetros hasta varios centímetros.

Ejemplos.

- Úlcera por presión
- Úlcera vascular
- Úlceras por diabetes.



11. Petequias

Pequeñas manchas rojas, moradas, o marrones que aparecen en la piel, causadas por sangrado. (capilares sangran)

Características:

- Del tamaño de una cabeza de alfiler
- No pican ni duelen
- No se vuelven blancas al presionar.
- Pueden extenderse por grandes zonas del cuerpo en pocas horas.
- Miden $< 4\text{mm}$ de diámetro.
- Suelen aparecer en racimos en brazos, etc.

Ejemplos.

- Vasculitis
- Trombocitopenia
- Esfuerzo prolongado (toser, vomitar, etc.).



12. Púrpura:

Lesión cutánea que aparece como manchas violáceas causadas por hemorragias de pequeños vasos sanguíneos.

Características:

Puede aparecer en piel y membranas mucosas.

Más frecuente en extremidades inferiores.

Mide entre 4 y 10 mm de diámetro.

Ejemplos:

- Disminución de plaquetas
- Fármacos
- Procesos infecciosos



13. Equimosis

Caracterizada por una decoloración, similar a un moretón, causada por la ruptura de vasos sanguíneos

Características

- Suele ser inofensiva y sana por sí sola.
- Color violáceo, azulado o amarillento.
- Mide más de 1cm de diámetro.
- Sensible al tacto
- Puede ser dolorosa e inflamada.

Ejemplos.

- Golpes o lesiones
- Infecciones que debilitan vasos sang.
- Medicamentos anticoagulantes.

