



OIDO

Hanna Abigail Lopez Merino

Tercer Parcial


Propedéutica Semiología y diagnóstico físico

Dra. Karla Sofía Lopez Gutiérrez.

Medicina Humana

4 grupo B

Comitán de Domínguez, 31 de mayo del 2025





EROSIONES

Áreas abiertas que resultan de la pérdida parcial o total de la epidermis, la capa superficial de la piel y suelen ser causadas por trauma.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia: Áreas abiertas de la piel, a veces con un aspecto de excavación en la capa superficial.

Curación: las erosiones suelen curarse sin dejar cicatrices, ya que la piel se regenera.

Dolor: las erosiones suelen ser dolorosas.




PETEQUIAS

Pequeños puntos rojos, morados o marrones que aparecen en la piel y son causados por sangrado.

CARACTERÍSTICAS

Son puntos redondeados del tamaño de una cabeza de alfiler.

Se forma en la piel o las mucosas. No son elevados ni pican. No son una erupción.



ULCERAS

Son lesiones que se caracterizan por la pérdida de la epidermis, parte de la dermis y a veces, la hipodermis, crea una solución de continuidad en la piel.

CARACTERÍSTICAS: piel agrietada, ampollada, escamosa, o desgarrada, puntos de presión dolorosa o muy sensibles, puntos de presión rojos en la piel, manchas color amarillentas.



EQUIMOSIS

Es una mancha en la piel que aparece cuando se rompen los vasos sanguíneos y se acumula sangre bajo la piel.

CARACTERÍSTICAS

coloración violácea, azulada, amarillenta, negra, azul o rosa o morada, manchas que aumentan de intensidad a los 3-4 días y disminuyen. Resolución completa. Puede tardar 2 a 3 semanas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Estrada, S., Escandón, K., Gaviria, Á., Mejía, L. V., Marín, J. I., Montoya, D., Ochoa-Díaz, M. M., Plata, J. D., Sánchez, G. I., & Zapata, J. P. (2022). Protocolos de diagnóstico y tratamiento de lesiones primarias de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Colombia, 2022. *Infectio*, 250-261. <https://doi.org/10.22354/24223794.1058>