



**Universidad del sureste**

**Medicina Humana**

**Campus Comitán**



**Lesiones Primarias**

**Ángel Antonio Suárez Guillén**

**4to Semestre**


**Grupo B**

**Propedeutica, Semiología y Diagnóstico Físico**

**Dra. Karla Sofía López Gutiérrez**

**01/04/2025**

# Mácula




**Definición:** Una macula es un área plana circunscrita, cambio de coloración de la piel, que mide menos de 1 cm de diámetro

**Características:**

- Plana (sin relieve ni depresión).
- Menor de 1 cm de diámetro.
- Cambio de color en la piel

# Parche




**Definición:** Un parche es un área plana circunscrita, con cambio de color de la piel, que mide más de 1 cm de diámetro.

**Características:**

- Plana, sin relieve ni depresión.
- Mayor de 1 cm de diámetro.
- Cambio de color en la piel
- Puede tener bordes bien definidos o difusos.

# Placa




**Definición:** Una placa es una gran elevación de piel mas plana, a veces formada por pápulas que se unen .

## **Características:**

- Elevada, con relieve sobre la piel.
- Mayor de 1 cm de diámetro.
- Meseta en la superficie (es aplanada).
- Puede tener bordes bien definidos o irregulares

# Nódulo




**Definición:** Un nódulo es un abultamiento sólido de piel, de más de 1 cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel

## **Características:**

- Elevada y sólida.
- Mayor de 1 cm de diámetro.
- Ubicación profunda, comprometiendo la dermis y/o el tejido subcutáneo.
- Consistencia firme o elástica.

# Pústula




**Definición:** Una pústula es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento

## **Características:**

- Elevada, con contenido en su interior.
- Contiene pus (leucocitos y líquido inflamatorio).
- Pequeña, generalmente menor de 1 cm.
- Puede ser estéril o infecciosa.

# Vesícula




**Definición:** Una vesícula es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide menos de 1 cm de diámetro.

## **Características:**

- Elevada, con contenido en su interior.
- Llena de líquido seroso o claro.
- Menor de 1 cm de diámetro.
- Pared delgada, puede romperse fácilmente.

# Ampolla




**Definición:** Una ampolla es una elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide más de 1 cm de diámetro.

## **Características:**

- Elevada, con contenido en su interior.
- Llena de líquido seroso o hemorrágico.
- Mayor de 1 cm de diámetro.
- Pared delgada, puede romperse y dejar erosión.

# Habón




**Definición:** Un habón es una lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico; también se le denomina roncha o urticaria. Las ronchas suelen durar menos de 24 h.

## **Características:**

- Elevada y bien delimitada.
- De forma irregular y generalmente transitoria.
- Enrojecida o pálida en su centro, con un borde más oscuro.
- A menudo pruriginosa (causa picazón).

# Erosión




**Definición:** La erosión es una lesión secundaria de la piel caracterizada por una pérdida superficial de la epidermis, que no afecta la dermis, dejando una superficie húmeda y roja.

## **Características:**

- Pérdida superficial de la epidermis.
- No afecta la dermis.
- Superficie húmeda y rojiza.
- No deja cicatriz si se cura correctamente.
- Dolorosa y puede estar acompañada de secreción serosa.

# Úlcera




**Definición:** La úlcera es una lesión primaria o secundaria de la piel caracterizada por una pérdida profunda de la epidermis y la dermis, que puede afectar tejidos más profundos.

**Características:**

- Pérdida profunda de la epidermis y dermis, que involucra tejidos subyacentes.
- Superficie irregular y húmeda.
- Bordes generalmente indefinidos.
- Dolorosa.
- Tendencia a ser crónica o recurrente.

# Petequias



**Definición:** Las petequias son pequeñas manchas rojas o moradas en la piel causadas por sangrado subcutáneo, generalmente de menos de 3 mm de diámetro, que no desaparecen al presionar.

## **Características:**

- Pequeñas manchas de color rojo, morado o púrpura.
- Menores de 3 mm de diámetro.
- No desaparecen al presionar la piel.
- Causadas por sangrado subcutáneo, debido a la ruptura de capilares.
- Pueden ser múltiples y distribuidas de forma generalizada o localizada.

# Purpura



**Definición:** s una lesión cutánea caracterizada por manchas rojas o moradas más grandes que las petequias, causadas por sangrado subcutáneo

## **Características:**

- **Manchas rojas o moradas**
- **Mayor que las petequias**
- **Causado por sangrado subcutáneo**
- **Generalizada o localizada**
- **No desaparece al presionar**

# Equimosis



**Definición:** es una lesión de la piel causada por un sangrado subcutáneo más extenso, que aparece como una mancha de color morado o azul

**Características:**

- Mancha de color morado, azul o verde
- Puede ser extensa
- Causado por sangrado subcutáneo por ruptura de VS

# Bibliografía

- **Bates, B. (2020). Bates. Guía de exploración física y entrevistas (13.ª ed.).**