



**Mi Universidad**

**Facies**

*José Antonio Jiménez Santis*

*Primer Parcial I*

*Semiología*

*Dra. Karla Sofía López Gutierrez*

*Medicina Humana*

*Cuarto semestre grupo "B"*

*Comitán de Domínguez Chiapas 28 de febrero del 2025*

### La facies renal

También llamada "muñeco chino", es una apariencia que toman los enfermos renales debido al edema de los párpados y la cara, que la hace aparecer redondeada y con los ojos oblicuos y escasamente abiertos. Esta facies se diferencia de la facies hipotiroidea porque el paciente presenta ansiedad y depresión motivadas por su enfermedad



**Facies renal**



### Facies caquética

Se observa en todos los estados crónicos de desnutrición. Se caracteriza, principalmente por el enflaquecimiento general de la cara, la acentuación de las arrugas y, generalmente la palidez. Esta es la facies de la mayoría de los casos avanzados de tuberculosis, de cáncer, y diabetes. En los niños de pecho, el trastorno de nutrición general, da a la cara el aspecto de "Pequeño Viejo", es decir, Atrepsia.

### La facie lúpica

Es una manifestación clínica que se presenta en aproximadamente el 40% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES). Se caracteriza por una lesión eritematosa y descamativa en las mejillas y el arco nasal, conocida también como eritema en alas de mariposa. En la fase crónica de la enfermedad, la piel puede atrofiarse y aparecer telangiectasias.



### Facies Cianótica

Se observa una coloración azulada en los labios, mejillas, nariz y lóbulos de las orejas debido a la hipoxia o insuficiencia circulatoria.

### **Facies parkinsoniana**

Se caracteriza por inexpressión de la cara, fijeza de la mirada, falta de parpadeo, supresión de la mímica, aspecto grasoso de la cara —cara de pomada— y la boca entreabierta con sialorrea.



### ***Facies de Cushing***

Cara de luna llena abotagada y con papada, cuello de toro y cianosis; la piel delgada, con estrías cutáneas.

### **Facies mongoloide**

Ojos oblicuos, microcefalia, labios grandes, macroglosia, hipertelorismo y epicanto




### **Facies del síndrome de Claude Bernard Horner**

Producida por parálisis del simpático cervical, se caracteriza por disminución de la hendidura palpebral —enoftalmos— del lado paralizado, congestión de la conjuntiva y miosis por predominio de la acción del motor ocular común y ptosis palpebral.

## Facies acromegálica

Gran desarrollo de la nariz, maxilar inferior, arcos superciliares y cigomáticos, labios y lengua. Hay cejas pobladas y unidas por la parte interna



## Facies hipertiroidea

Mirada fija de verdadero terror, rigidez de la expresión, exoftalmos e intensos cambios vasomotores de la piel de la cara



## Facie anémica

Es la apariencia facial característica en personas con anemia severa, debido a la disminución de la hemoglobina en sangre, lo que provoca una reducción en la oxigenación de los tejidos. Características: Palidez cutáneo-mucosa, especialmente en labios, conjuntivas y pabellones auriculares. Piel fina y opaca, con posible sequedad. Ojos hundidos y ojeras, por la mala oxigenación tisular. Labios pálidos y a veces ligeramente cianóticos en casos graves. Astenia y adinamia, con expresión de fatiga o cansancio. Uñas frágiles y quebradizas, especialmente en anemias ferropénicas. Cabello seco y con tendencia a la caída en casos prolongados



## La facies leonina

Es una facies que se parece a la de un león. Se observa en múltiples afecciones y se ha descrito clásicamente para la lepra lepromatosa, así como para la enfermedad ósea de Paget