



Mi Universidad

FACIAS

Hanna Abigail Lopez Merino

Segundo Parcial

Propedéutica Semiología y diagnóstico físico

Dra. Karla Sofía Lopez Gutiérrez.

Medicina Humana

4 grupo B

Comitán de Domínguez, 13 de abril del 2025

LESIONES PRIMARIAS



MACULA

Es una mancha plana en la piel, que se diferencia del color de la piel circundante.

CARACTERÍSTICAS: Mancha plana, visible, sin relieve ni cambios de textura, menor de 1 cm de ancho, color puede ser clara o más oscura.



PARCHE

Mancha plana de color diferente al de la piel que es mayor a 1 cm de ancho.

CARACTERÍSTICAS: Aparece en piel sana, y es el primer indicio de una alteración, es una lesión plana y no puede palpar, no es desniel respecto de la superficie de la piel.



PLACA

Lesión elevada, sólida y superficial que se puede palpar.

CARACTERÍSTICAS: suele medir de 10 mm de diámetro, puede tener plano o abombado, está asociado con una serie de afecciones de la piel.



NODULO

Protuberancia sólida o quística que se presenta bajo la piel.

CARACTERÍSTICA: Puede variar en textura, color, movilidad y sensibilidad, algunos son dolorosos al tacto, mientras otros son totalmente inodoros, pueden ser causados por acumulación de tejido anormal, inflamación, infección o por procesos neoplásicos.



PUSTULA

Lesión que se parece a una ampolla llena de pus.

CARACTERÍSTICAS: son lesiones sobre elevadas, suelen tener un extremo amarillento, puede estar asociado con infecciones bacterianas o inflamaciones.



AMPOLLA

Es una protuberancia llena de líquido que se forma en la piel.

CARACTERÍSTICAS: Bolsa de piel llena de líquido acuoso, fricción, calor, quemaduras, infecciones, enfermedades en la piel.



EROSIONES

Se produce cuando se pierde las capas superficiales de la piel. **CARACTERÍSTICAS:** son áreas abiertas de la piel, suele ser el resultado de un traumatismo como rasarse intensamente.



VESICULA

Pequeña elevación de la piel llena de líquido claro.

CARACTERÍSTICAS: Menos de 5 milímetros de diámetro, líquido claro o seroso, elevación circunscrita de la epidermis, puede brotar directamente o a partir de una macula o papula.



HABEON

Es una roncha.

Inflamación de la piel que se caracteriza por ser roja, elevada y erigínosa.

CARACTERÍSTICAS: Aparecen en cualquier parte del cuerpo, cambian de forma y desaparecen, a más de 48 hrs, rojo, erigín, o caer piel.



EROSIONES

Áreas abiertas que resultan de la pérdida parcial o total de la epidermis, la capa superficial de la piel y suelen ser causadas por trauma.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia: Áreas abiertas de la piel, a veces con un aspecto de excavación en la capa superficial.

Curación: Las erosiones suelen curarse sin dejar cicatrices, ya que la piel se regenera.

Dolor: Las erosiones suelen ser dolorosas.



PETEQUIAS

Pequeños puntos rojos, morados o marrones que aparecen en la piel y son causados por sangrado.

CARACTERÍSTICAS

Son puntos redondeados del tamaño de una cabeza de alfiler.

Se forma en la piel o las mucosas. No son elevados ni pican. No son una erupción.



ULCERAS

Son lesiones que se caracterizan por la pérdida de la epidermis, parte de la dermis y a veces, la hipodermis, crea una solución de continuidad en la piel.

CARACTERÍSTICAS: piel agrietada, ampollada, escamosa, o desgarrada, puntos de presión dolorosa o muy sensibles, puntos de presión rojos en la piel, manchas color amarillentas.



EQUIMOSIS

Es una mancha en la piel que aparece cuando se rompen los vasos sanguíneos y se acumula sangre bajo la piel.

CARACTERÍSTICAS

coloración violácea, azulada, amarillenta, negra, azul o rosa o morada, manchas que aumentan de intensidad a los 3-4 días y disminuyen. Resolución completa. Puede tardar 2 a 3 semanas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Estrada, S., Escandón, K., Gaviria, Á., Mejía, L. V., Marín, J. I., Montoya, D., Ochoa-Díaz, M. M., Plata, J. D., Sánchez, G. I., & Zapata, J. P. (2022). Protocolos de diagnóstico y tratamiento de lesiones primarias de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Colombia, 2022. *Infectio*, 250-261. <https://doi.org/10.22354/24223794.1058>