



Mi Universidad

Lesiones en la piel.

Esmeralda Pérez Méndez

Cuarto B

Semiología.

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez.

Medicina Humana

Segundo parcial.

Macúla



Es un área plana circunscrita, con cambio de coloración de la piel que mide < 1 cm de diámetro

Parcha



Es un área plana circunscrita, con cambio de color de la piel, que mide más de un 1 cm de diámetro

- No palpable sin elevación ni depresión puede ser hiperpigmentado, hipopigmentado, eritematoso, etc.

Placa



Es una gran elevación de piel más plana, a veces formada por pápulas que se unen.

- Generalmente > 1 cm, puede tener bordes definidos.

Ejemplo: psoriasis, eccema crónico

Nódulo



Es un abultamiento sólido de piel de más de 1 cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.

- más profunda que una papula, puede ser dolorosa.

Ejemplo: lipoma, eritema nodoso

Pústula



Es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.

- Puede ser estéril o infecciosa, tamaño variable.
- Ejemplo: Acné pustuloso, Impétigo

Vesícula



Es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide < 1 cm de diámetro

- Su contenido puede ser seroso o sero hemático
- Ejemplo: herpes simple, Varicela.

Ampolla



Es una elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide > 1 cm de diámetro.

- Similar a una vesícula, pero más grande puede romperse fácilmente.
- Ejemplo: Quemadura de 2do grado, Peñfigo

hobón



Lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico, también se denomina roncha o urticaria.

- De aparición súbita, transitoria (desaparece en menos de 24 h), suele causar prurito

Erosión



Pérdida superficial de la epidermis.

- No deja cicatriz. Generalmente se produce por ruptura de vesícula o fricción.

-Ejemplo: Lesión por herpes simple.

Úlceras



Pérdida profunda del tejido que afecta epidermis, dermis y a veces tejidos más profundos.

- Puede dejar cicatriz de evolución lenta y suele ser dolorosa

-Ejemplo: úlcera por presión, úlcera venosa.

Defecias



Pequeñas lesiones hemorrágicas puntiformes, menores de 2 mm, no palpables.

- No desaparecen a la presión (signo de diascopia). Indica extravasación de sangre.

-Ejemplo: Trombocitopenia

Púrpura



Lesión hemorrágicas subcutáneas entre 2 mm y 1 cm de diámetro

- No desaparecen a la presión, puede ser palpable si hay vasculitis.

-Ejemplo: púrpura de henoch-Schönlein.

Equimosis.



Mancha hemorrágica > 1cm resultado de extravasación de sangre en piel.

- Cambia de color con el tiempo. (de rojo a verde/amarrillo). Similar a un hematoma.

- Ejemplo: Golpes, trastorno de coagulación.

Referencia

Bickley, L. S. (2021). *Bates. Guía de exploración física e historia clínica* (13.^a ed.). Wolters Kluwer.