

# Universidad del Sureste

## Licenciatura en Medicina Humana

### Autores:

Jonathan Omar Galdamez Altamirano  
William Said Pérez García

⋮

### Tema de investigación:

Resfriado común

### Asesor del proyecto:

Dr. Erick Jose Villatoro Verdugo

### Fecha:

### Lugar:

Comitán de Domínguez, Chiapas.

Jonathan Omar  
Williams Said

Noviembre 2025.

ii

Universidad del sureste, campus Comitán.

Medicina Humana.

Seminario de tesis.

Copyright © 2020 por Citlali Fernández y Mario Gordillo. Todos los derechos reservados.

Queremos dedicar esta tesina en primer lugar a Dios, a nuestros padres por su amor, apoyo y por forjarnos como la persona que somos actualmente, a nuestros hermanos y a todos los que nos rodean por ser mejores seres humanos día con día.

## **Agradecimientos**

v

Agradecemos profundamente a la Universidad del Sureste por permitirnos el uso de sus instalaciones y brindar el apoyo necesario para la realización de este protocolo de investigación. Al Dr. Erick José Villatoro Verdugo por su invaluable orientación, experiencia y acompañamiento académico. También agradecemos a todos los compañeros y docentes que participaron en la recolección de datos y contribuyeron con sus opiniones y disposición a responder el cuestionario. Finalmente, a nuestras familias, cuyo apoyo emocional y moral ha sido crucial en la elaboración de este proyecto

El proyecto de investigación tuvo como propósito evaluar la prevalencia del resfriado común entre los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Medicina Humana en la Universidad del Sureste, campus Comitán. A través de un enfoque cuantitativo no experimental de tipo longitudinal, se aplicaron cuestionarios estructurados a estudiantes con el fin de identificar frecuencia, duración, medidas preventivas y tratamiento del resfriado común, incluyendo factores como el uso de cubrebocas, automedicación y estaciones del año con mayor prevalencia.

El **marco teórico** fundamenta la investigación en definiciones de la OMS, Harrison y otros autores, explicando que el resfriado común es una infección viral autolimitada que afecta las vías respiratorias superiores. Se menciona su fisiopatología, transmisión, signos y síntomas, así como su impacto en grupos vulnerables. También se describe que el diagnóstico es principalmente clínico, sin requerir estudios de laboratorio en la mayoría de los casos.

En cuanto a los **resultados**, las gráficas evidencian que el 98% de los alumnos conocen sobre esta patología y el 100% ha sufrido al menos un episodio reciente. La mayor incidencia ocurre en invierno, siendo la duración más común de 4 a 7 días. El 55% de los estudiantes se automedica, utilizando paracetamol como tratamiento más frecuente. El 68% usa cubrebocas sencillo, y el 80% aplica gel antibacterial. El cuestionario fue aplicado entre diciembre 2024 y febrero 2025.

Las **conclusiones** destacan la necesidad de mejorar las prácticas preventivas entre los estudiantes y fortalecer la educación sobre el uso racional de medicamentos. Finalmente, se plantean sugerencias para implementar campañas educativas en la universidad, mejorar el acceso a servicios médicos y promover hábitos saludables entre la comunidad estudiantil.

## ABSTRACT:

The research project aimed to evaluate the prevalence of the common cold among fourth-semester students of the Human Medicine program at the University of the Southeast, Comitán campus. Using a non-experimental quantitative longitudinal

approach, structured questionnaires were administered to students in order to identify<sup>vii</sup> the frequency, duration, preventive measures, and treatment of the common cold, including factors such as mask usage, self-medication, and the seasons with the highest prevalence. The theoretical framework supports the research with definitions from the WHO, Harrison, and other authors, explaining that the common cold is a self-limiting viral infection that affects the upper respiratory tract. Its pathophysiology, transmission, signs and symptoms are discussed, as well as its impact on vulnerable groups. It is also described that the diagnosis is primarily clinical, without requiring laboratory studies in most cases. Regarding the results, the graphs show that 98% of students are aware of this pathology and 100% have experienced at least one recent episode. The highest incidence occurs in winter, with the most common duration being 4 to 7 days. 55% of students self-medicate, using paracetamol as the most frequent treatment. 68% use simple face masks, and 80% apply antibacterial gel. The questionnaire was conducted between December 2024 and February 2025. The conclusions highlight the need to improve preventive practices among students and to strengthen education on the rational use of medications. Finally, suggestions are made to implement educational campaigns at the university, improve access to medical services, and promote healthy habits among the student community.



## Tabla de Contenidos

ix

Planteamiento del problema.....	2
Pregunta de investigación .....	3
Importancia, justificación y viabilidad. ....	4
Variables .....	5
1. Objetivo general.....	10
2. Objetivos específicos .....	10
Fundamentación de la investigación.....	13
1. Antecedentes.....	13
2. Marco Teórico.....	14
2.1. Médicos internos de pregrado.....	14
2.1.1. Generalidades.....	14
2.1.2. Definición de internado.....	14
2.1.3. Drogas:.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.1.4. Drogas ilícitas .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.1.5. Drogas licitas. ....	20
2.1.6 Tipos de drogas.....	25
2.1.6.1. Drogas estimulantes:.....	25
2.1.6.2. Drogas depresivas: .....	28
2.1.6.3 Drogas hipnóticas y sedantes:.....	28
2.1.6.4. Drogas alucinógenos:.....	28
2.1.6.5. Drogas opioides: .....	29
2.1.6.6. Por su origen (naturales y sintéticas). .....	30
2.1.6.7. Por su acción farmacológica: .....	30
2.1.6.8. Por su consideración sociológica:.....	31
2.1.6.9. Por su peligrosidad para la salud. ....	31
2.1.7. Drogadicción:.....	32
2.1.8. Definición: .....	32
2.2. Costo social:.....	33
2.3. Fisiología: .....	34
2.4. Fisiopatología:.....	35
2.5. Tratamiento: .....	35
2.6. Pronostico: .....	36
2.7. Causas: .....	36
2.7.1. Curiosidad: .....	36
2.7.2. Problemas familiares:.....	37
2.7.3. Influencia en el entorno en el que se desarrollan los adolescentes: .....	37
2.7.4. Problemas familiares/carencia familiar: .....	37
2.7.5. Para sentirse bien: .....	37
2.7.6. Para sentirse mejor: .....	37
2.7.7. Para rendir mejor: .....	38
2.8. Signos y síntomas: .....	38
2.8.1. Área mental:.....	38

2.8.2. Familia: .....	38 <sup>x</sup>
2.8.3. Escuela: .....	38
2.8.4. Síntomas físicos. ....	38
2.9. Tipo de drogas más consumidas por adolescentes:.....	39
2.9.1. Alcohol:.....	39
2.9.1. Tabaco:.....	39
2.9.2. Marihuana:.....	39
2.9.3. Cocaína: .....	39
2.9.4. Heroína:.....	40
2.9.5. Alucinógenos: .....	40
3. Adicción:.....	40
3.1. Definición: .....	40
3.2. Adolescencia: .....	41
3.2.1. Generalidades:.....	41
3.2.2. Definición: .....	41
3.2.3. Pre- adolescencia: .....	41
3.2.4. Adolescencia temprana: .....	41
3.2.5. Adolescencia media: .....	41
3.2.6. Adolescencia tardía:.....	42
3.2.7. Pre- adolescencia: .....	42
3.2.8. Adolescencia temprana: .....	42
3.2.9. Adolescencia media: .....	42
3.3. Adolescencia tardía:.....	43
3.4. Cambios de la adolescencia: .....	43
3.4.1. Cambios físicos:.....	43
3.4.2. Cambios en la personalidad: .....	43
3.4.3. Cambios emocionales: .....	44
3.4.4. Desarrollo social: .....	44
3.5. Factores de riesgo de las drogas en adolescentes.....	44
3.5.1. Factores de riesgo individuales: .....	44
3.5.2. Factores de riesgo racionales: .....	45
3.5.3. Factores de riesgo sociales:.....	46
Marco normativo.....	47
Población.....	48
Muestra. ....	49
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. .....	50
Cronograma.....	51
Bibliografías:.....	52
Apéndice .....	57
CROQUIS: .....	57
CUESTIONARIO:.....	58
Tabuladores de datos obtenidos: .....	59
PRESUPUESTO:.....	67
Vita:.....	69







**Título de investigación.**

Prevalencia del resfriado común en los alumnos que integran la Universidad Del Sureste del 4to semestre de medicina humana en el período Diciembre 2024- Febrero 2025

### **Planteamiento del problema.**

La prevalencia del resfriado común es alta, con las personas afectadas experimentando entre dos y tres episodios por año, en promedio. Aunque no se considera una condición de alto riesgo en términos de mortalidad, el resfriado común afecta la calidad de vida de quienes lo padecen, causando molestias como congestión nasal, tos, dolor de garganta, estornudos y fiebre leve. Esto se traduce en una carga significativa para las personas afectadas, así como para la economía, debido al ausentismo laboral y escolar y al uso de servicios de salud.

Uno de los aspectos más relevantes es la falta de tratamientos efectivos para combatir el resfriado común. Los tratamientos actuales solo abordan los síntomas, pero no curan la enfermedad. Los medicamentos de venta libre, aunque eficaces para aliviar temporalmente algunos síntomas, no pueden prevenir la infección ni eliminarla. De igual manera, las estrategias preventivas como el lavado de manos y la vacunación (en algunos casos) tienen un impacto limitado en la prevención de la enfermedad, ya que no protegen completamente contra todos los virus que causan el resfriado común.

A pesar de estos desafíos, la investigación sobre el resfriado común ha sido insuficiente. Existen limitaciones en el desarrollo de tratamientos antivirales específicos para los virus responsables de la enfermedad. Además, las campañas de educación pública y las estrategias de prevención, aunque eficaces en ciertos contextos, no logran eliminar por completo los casos de resfriado común en la población general.

Por lo tanto, es necesario desarrollar protocolos más efectivos, tanto en términos de prevención como de tratamiento, que permitan abordar de manera más integral el impacto del resfriado común en la sociedad.

**Pregunta de investigación.**

¿Cuál es el porcentaje de los alumnos de 4to semestre de la carrera de medicina humana de la universidad del sureste campus Comitán, que han presentado resfriado común en el período diciembre 2024-2025?

## **Importancia, justificación y viabilidad.**

La **importancia** del resfriado común es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, afectando a personas de todas las edades y provocando millones de consultas médicas cada año. Aunque no representa una amenaza grave para la mayoría de la población, sus efectos en la productividad laboral, la educación y el bienestar general son significativos. Además, en poblaciones vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, puede derivar en complicaciones más serias, como neumonía o bronquitis. Comprender mejor esta enfermedad y las formas de prevenirla es clave para mejorar la salud pública y reducir su impacto socioeconómico.

La **justificación** a pesar de su prevalencia, el resfriado común sigue siendo un desafío médico sin cura definitiva. La falta de una vacuna efectiva y la naturaleza cambiante de los virus que lo causan hacen que su estudio continúe siendo relevante. Este artículo busca proporcionar información actualizada sobre los factores de riesgo, las estrategias de prevención y los tratamientos disponibles, ayudando a la población a manejar mejor la enfermedad y reducir su propagación. Además, al analizar los avances científicos recientes, se pueden identificar nuevas perspectivas para el desarrollo de terapias más eficaces.

La **viabilidad** en realización de este artículo es factible, ya que existe una amplia cantidad de estudios científicos, datos epidemiológicos y fuentes médicas confiables que pueden respaldar la información. Además, la accesibilidad a expertos en virología, inmunología y salud pública permite enriquecer el contenido con opiniones fundamentadas. La difusión del artículo en medios digitales y revistas especializadas garantizará su alcance a un público amplio, incluyendo profesionales de la salud y ciudadanos interesados en mejorar su bienestar.

## Variables.

### 1. Identificación.

Variables:	Tipo de variable:	Definición conceptual:	Definición operacional:
<b>Sexo.</b>	Dependiente	Condición orgánica, masculina o femenina.	Se incluirá aquellos que declaran pertenecer a otra definición sexual; para la obtención de información se utilizará el cuestionario preestablecido: a.-Hombre      b.-Mujer
<b>Grupo.</b>	Dependiente.	Conjunto de personas pertenecientes a un grupo en específico o que comparten una ideología.	Se incluirá a todas las personas que cursen en el 4to semestre de la facultad de medicina humana.
<b>Edad.</b>	Dependiente	Es el tiempo de edad en la que cursa la licenciatura de medicina humana .	Se incluirá a todas las personas que brinden cuantos años de edad tienen y se excluirán a todos aquellos que se encuentren en el rango de edad información certera y concreta.
<b>Condición socioeconómica</b>	Dependiente	Condición sociocultural de un individuo al pertenecer o aquirir un ingreso monetario alto o bajo.	Se incluirá a todos los estudiantes que describan tener menores y mayores recursos para proteger su salud contra la rinofaringitis.
<b>Otros grupos que no son de 4to semestre</b>	Independiente	Alumnos que son de otros semestres y no forman parte del 4to semestre de medicina humana.	Se excluira si no forma parte de la carrera de medicina del semestre específico de cuarto semestre.

<b>Otras carreras que no son de medicina humana en UDS</b>	Independiente	Alumnos que son de la universidad del sureste pero en diferente carrera a la licenciatura en medicina humana.	No se incluira a los alumnos que no formen parte de la licenciatura en la carrera de medicina humana.
<b>Alumnos que no pertenecen a la universidad del sureste</b>	Independiente	Alumnos que no pertenecen a esta universidad del surste campus Comitán.	Se excluira a alumnos de medicina del cuarto semestre de medicina humana campus Tapachula.
<b>Docentes de la universidad del sureste</b>	Independiente	A los docentes y maestros que imparten clases a todos los alumnos de medicina humana.	Se excluira a los docentes que esten impartiendo alguna materia en el salon de clases de el area de medicina.
<b>Personas adultas que no forman parte de la UDS</b>	Independiente	Personas adultas que no estan en la universidad del sureste como padres de familia o personal de limpieza.	Se excluira a los padres de familia y al personal de limpieza de la encuesta que se realizara en UDS.

### **Definición conceptual y definición operacional.**

**Sexo:** Se definirá como la condición que nos distingue entre hombres y mujeres, y se incluirá a todos aquellos que señalen pertenecer a una de estas dos categorías hombre o mujer y se excluirá aquellos que declaren pertenecer a otra definición sexual; para la obtención de información se utilizara el cuestionario preestablecido, y se medirá en los criterios ya establecidos como: a.-Hombre b.-Mujer.

**Edad:** Se definirá como el tiempo que ha vivido una persona, se incluirá a todas las personas que brinden cuantos años de edad tienen y se excluirán a todos aquellos que no brinden información certera y concreta.

**Estrés:** Se definirá estrés como aquella tensión ya sea física o emocional que es ocasionado por cualquier situación que nos haga sentir preocupados, enojados o disgustados. Se incluirá a todos los estudiantes que describan estar estresados por motivos de su carrera (enojados, tristes, contentos, preocupados, angustiados, etcétera) y se excluirá a todos los estudiantes que describan que jamás han sentido estrés por motivo de su carrera.

**Hipótesis principal:**

En este trabajo pretendemos descifrar los factores y determinantes de todas las posibles causas del resfriado comun por el cual los alumnos de medicina humana de 4to semestre de la universidad del sureste se ven influenciados u orillados a padecer resfriado comun, teniendo un conocimiento basto y amplio sobre esta enfermedad.

**Hipótesis secundarias:**

1. Pretendemos encontrar en los alumnos, un sistema inmunológico bajo, por estrés academicos.
2. Pretendemos hallar una mayor prevalencia en el sexo masculino.
3. Pretendemos identificar similitudes de los signos y simtomas entre alumnos
4. Queremos comprobar que una buena alimentacion influye en el padecimiento del resfriado comun.
5. Pretendemos encontrar que la menor parte de alumnos tienen el habito de usar cubrebocas durante una enfermedad
6. Pretender demostrar que la estacion de invierno tiene una mayor predominio de casos de resfriado comun.
7. Pretender hallar a algunos alumnos que se automedican con paracetamol.
8. Pretender reafirmar que gran parte de los alumnos se contagian dentro de la universidad
9. Pretendemos encontrar que los alumnos que viajan en transporte publico tienen un porcentaje mayor a contagiarse de resfriado comun.
10. Pretendemos encontrar que todos los alumnos que todos los alumnos se laven las manos antes de comer
11. Pretendemos encontrar que la mayoria de alunos no se cubre al estornudar
12. Pretendemos encontrar que en el salon de 4to C de medicina humana tiene una mayor incidencia por tener mas alumnos.

13. Pretendemos encontrar el tiempo de duracion del resfriado comun es menor a 5 dias

**Objetivos**  
**Objetivo general**

Demostrar cómo perjudica a su salud respiratoria en la estación del año invierno-primavera a los médicos de la universidad del sureste específicamente los alumnos de 4to grado, proponiendo medidas para disminuir los factores desencadenantes

**1. Objetivos específicos**

1. Conocer de qué manera afecta negativamente a su salud el resfriado común a los alumnos de 4to semestre.
2. Señalar las consecuencias e implicaciones de la rinofaringitis en los alumnos de 4to semestre.
3. Identificar las posibles causas y consecuencias de desencadenar la rinofaringitis fuera y dentro de la universidad del sureste en los alumnos de 4to semestre.
4. Evaluar todos los factores de riesgo, con el propósito de conocer los principales motivos de contagio de la enfermedad .
5. Conocer las principales características y diferencias que pueden llegar a existir entre ambos sexos durante la etapa de latencia y convalecencia de la enfermedad.
6. Conocer los principales efectos, causas, síntomas y consecuencias del resfriado común en los alumnos de medicina de 4to semestre.
7. Identificar a qué sexo (masculino o femenino) es más afectado con el resfriado común.
8. Identificar los factores determinantes que son causales del resfriado común.
9. Conocer si la mayoría de alumnos utiliza cubrebocas al momento de tener alguna enfermedad respiratoria.
10. Identificar el porcentaje de alumnos que utiliza cubrebocas sin estar enfermo sino por motivos de que en el salón algún compañero está enfermo.

**Tipo de investigación.****1. Orientación.**

Científica.

**2. Enfoque.**

Cuantitativo.

**3. Alcance.**

Explorativo.

**4. Diseño.**

Cuantitativo no experimental.

**5. Temporalidad.**

Longitudinal.



**Fundamentación de la investigación.****1. Antecedentes.**

En Barcelona oct. 2020 Epub 23-NOV-2020 se realizó una Revista clínica de Medicina de la familia.Fam.Vol.13 no. 3. El resfriado común es una patología banal autolimitada generalmente medicada incluso en muchas ocasiones con antibióticos. Por lo que es imprescindible adoptar una actitud racional a la hora de prescribir un tratamiento farmacológico.

El 2 de febrero del 20231 el sitio Biblioteca nacional de medicina, Medline PLUS, departamento of family medicine publicó una revista resfriado común en la mayoría de los casos causa rinorrea o secreción nasal, congestión nasal y estornudo. Asimismo, es posible que se presente dolor de garganta, tos, dolor de cabeza u otros síntomas en lo cual es una enfermedad con mucha infectabilidad.

En 2017 el autor J. De flor i Brú, publicó una revista sobre Infecciones de vías respiratorias altas- 1: Resfriado común Pediatr, El resfriado es el diagnóstico más frecuente en una consulta de pediatría de atención pediátrica. La gran cantidad de recursos que se dedica a esta enfermedad obliga a que el pediatra actúe como educador de la familia, con el objetivo de lograr un mayor automanejo.

## 2. Marco Teórico.

### 2.1. Patología (Resfriado común)

#### 2.1.1. Definición

##### 2.1.1.1 Según la OMS

el resfriado común es una “Infección viral frecuente del tracto respiratorio superior que causa síntomas como congestión nasal, estornudos y dolor de garganta”-

##### 2.1.1.2 Según Harrison

Principios de la medicina interna “El resfriado común es una enfermedad leve de origen viral caracterizada por la inflamación de la mucosa nasal y faríngea”

##### 2.1.1.3 Según Goldman & Schafer,

el resfriado común es “Una infección viral autolimitada de las vías respiratorias superiores”

#### 2.1.2. Fisiopatología . (Porth 10ed)

Mecanismo El resfriado común es una infección viral aguda del tracto respiratorio superior, causada principalmente por rinovirus, aunque otros virus como coronavirus, adenovirus, parainfluenza y el virus sincitial respiratorio (VSR) también pueden provocarlo. Es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes a nivel mundial, con una alta incidencia en la población general. Su fisiopatología involucra la interacción entre el virus, las células epiteliales respiratorias y la respuesta inmune del huésped, generando los síntomas característicos como congestión nasal, rinorrea, tos y malestar general.

##### 2.1.2.1 Transmisión e Infección Inicial (Porth 10ed)

El resfriado común se transmite principalmente a través de dos mecanismos:

**Por gotículas respiratorias:** La tos, los estornudos y el habla liberan pequeñas partículas virales que pueden ser inhaladas por personas cercanas, facilitando la propagación del virus.

Por contacto directo: El virus puede sobrevivir en superficies inanimadas (fómites) durante varias horas. Al tocar estas superficies y llevarse las manos a la nariz, la boca o los ojos, la persona puede autoinocularse.

Una vez que el virus entra en el organismo, generalmente a través de la mucosa nasal o conjuntival, se adhiere a las células epiteliales respiratorias. En el caso del rinovirus, el receptor celular predominante es la molécula de adhesión intercelular-1 (ICAM-1), presente en las células epiteliales nasales. Otros virus, como los coronavirus, utilizan diferentes receptores, como la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2).

La unión del virus a los receptores celulares desencadena su internalización mediante endocitosis. Una vez dentro de la célula, el virus libera su material genético, iniciando el proceso de replicación viral.

#### 2.1.2.2 Replicación Viral y Daño Epitelial (Robbins 10ed)

La replicación viral ocurre en las células epiteliales de la mucosa nasal y faríngea. Durante este proceso:

El virus secuestra la maquinaria celular para producir nuevas copias de su material genético y proteínas virales.

Estas nuevas partículas virales son liberadas, infectando células vecinas y amplificando la carga viral.

La replicación viral provoca daño citopático directo:

Desprendimiento de células epiteliales, lo que altera la barrera mucociliar.

Disminución de la motilidad ciliar, lo que reduce la capacidad de eliminación de mucus y agentes patógenos.

Inflamación local, desencadenada por la liberación de mediadores proinflamatorios.

El daño epitelial genera una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas secundarias, como sinusitis o faringitis.

#### 2.1.2.3 Respuesta Inmune Innata (Robbins 10ed)

La replicación viral activa la respuesta inmune innata, la primera línea de defensa del organismo:

Liberación de citoquinas proinflamatorias: Las células infectadas producen citoquinas como la interleucina-1 (IL-1), IL-6, IL-8 y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF- $\alpha$ ). Estas moléculas promueven la inflamación local, causando congestión y edema tisular.

Producción de interferones (IFN- $\alpha$ , IFN- $\beta$ ): Estas moléculas tienen propiedades antivirales, ya que interfieren con la replicación viral e inducen un estado antiviral en las células circundantes.

Quimiotaxis de leucocitos: Los neutrófilos y monocitos son atraídos hacia el sitio de infección, donde contribuyen a la eliminación viral, pero también generan inflamación adicional.

El resultado de esta inflamación local es el edema y la vasodilatación en la mucosa nasal, lo que causa la congestión nasal característica. La activación de las células caliciformes también aumenta la producción de moco, provocando rinorrea.

#### 2.1.2.4 Respuesta Inmune Adaptativa (Robbins 10ed)

A medida que la infección progresá, la inmunidad adaptativa entra en acción, siendo esencial para la eliminación del virus:

Activación de linfocitos T:

Las células dendríticas presentan antígenos virales a los linfocitos T, desencadenando su activación.

Los linfocitos T citotóxicos (CD8+) destruyen las células infectadas, limitando la replicación viral.

Los linfocitos T cooperadores (CD4+) potencian la activación de linfocitos B y la producción de anticuerpos.

Producción de anticuerpos específicos:

Los linfocitos B producen inmunoglobulinas (principalmente IgA e IgG) dirigidas contra las proteínas virales.

Estos anticuerpos neutralizan el virus, evitando que infecte nuevas células.

Sin embargo, la gran variabilidad antigenica de los virus del resfriado, en particular del rinovirus, limita la protección a largo plazo, lo que explica las frecuentes reinfecciones.

#### 2.1.2.5 Cambios Fisiopatológicos y Síntomas (Robbins 10ed)

La combinación del daño epitelial, la inflamación local y la respuesta inmune da lugar a los síntomas característicos del resfriado común:

**Congestión nasal:** La vasodilatación y el edema mucoso obstruyen las vías nasales.

**Rinorrea:** El aumento de la producción de moco y la alteración del aclaramiento mucociliar provocan secreción nasal abundante.

**Estornudos:** Son el resultado de la estimulación de terminaciones nerviosas por la inflamación local.

**Tos:** Surge debido a la irritación de la garganta y la presencia de moco.

**Fiebre y malestar:** En algunos casos, la liberación de citoquinas inflamatorias sistémicas provoca fiebre leve y sensación de fatiga.

#### 2.1.2.6 Resolución y Recuperación (Robbins 10ed)

En la mayoría de los casos, el resfriado común es una enfermedad autolimitada que se resuelve en 7-10 días. La recuperación implica:

Eliminación del virus: Gracias a la acción combinada de la respuesta inmune innata y adaptativa.

Regeneración epitelial: Las células epiteliales dañadas son reemplazadas por nuevas células, restaurando la barrera mucociliar.

En individuos inmunocompetentes, la enfermedad suele ser leve. Sin embargo, en poblaciones vulnerables (niños, ancianos o personas inmunodeprimidas), el resfriado puede derivar en complicaciones secundarias, como bronquitis o exacerbación de enfermedades respiratorias crónicas (asma, EPOC).

### 2.1.3. Cuadro clínico (*Infectología, Kumate- Gutiérrez*)

#### 2.1.3.1 Síntomas principales

**Congestión nasal:** Inflamación de la mucosa nasal que provoca dificultad para respirar.

**Rinorrea:** Secreción nasal clara y acuosa, que puede volverse espesa con la evolución del cuadro.

**Estornudos:** Reflejo defensivo frecuente debido a la irritación nasal.

**Dolor de garganta:** Irritación o carraspera leve, que puede evolucionar a dolor moderado.

**Tos:** Suele ser seca al inicio y, en algunos casos, puede volverse productiva.

**Malestar general:** Sensación de cansancio, fatiga y decaimiento leve.

**Fiebre leve:** En adultos es poco común, pero puede presentarse en niños.

#### 2.1.3.2 Signos clínicos observables (*Infectología, Kumate- Gutiérrez*)

**Hiperemia faríngea:** Enrojecimiento leve de la faringe por inflamación.

**Mucosa nasal inflamada:** Acompañada de secreción acuosa o mucopurulenta.

**Lagrimeo:** En algunos casos, debido a la irritación ocular.

**Congestión timpánica:** Ocasionalmente, en casos más avanzados, puede haber inflamación en las trompas de Eustaquio.

#### 2.1.3.3 Síntomas poco comunes (*Infectología, Kumate- Gutiérrez*)

**Epistaxis leve:** Por irritación o resequedad nasal.

**Vértigo leve:** Debido a la congestión de las trompas de Eustaquio.

**Hiposmia o anosmia temporal:** Pérdida parcial o total del olfato, frecuente en infecciones virales.

**Dolor ocular leve:** Por irritación conjuntival secundaria.

**Disfagia leve:** Dificultad para tragar, asociada a inflamación faríngea.

#### **2.1.4. Diagnóstico (Guía de práctica clínica Faringoamigdalitis)**

El diagnóstico del resfriado común suele ser clínico, basado en la historia del paciente y el examen físico. Sin embargo, en algunos casos, especialmente si se sospechan complicaciones o diagnóstico diferencial, se pueden solicitar estudios complementarios.

##### **2.1.4.1 Imagenológico**

En el resfriado común no se requieren estudios de imagen de rutina, ya que la patología afecta principalmente las vías respiratorias superiores sin alteraciones visibles. Sin embargo, en casos de sospecha de complicaciones (como sinusitis o neumonía), se utilizan las siguientes técnicas:

**Radiografía de tórax:** Para descartar infecciones respiratorias bajas (neumonía) en pacientes con tos persistente o fiebre elevada.

**Radiografía de senos paranasales:** Puede mostrar opacificación o engrosamiento de la mucosa en casos de sinusitis bacteriana secundaria.

##### **2.1.4.2 Signos Radiológicos**

En el resfriado común no suele haber hallazgos radiológicos relevantes, pero si hay complicaciones pueden observarse:

**En sinusitis bacteriana:** Engrosamiento de la mucosa sinusal, niveles hidroaéreos o velamiento de los senos paranasales.

**En casos graves con afección pulmonar:** Infiltrados difusos o consolidaciones, aunque esto es raro y sugiere una infección secundaria.

##### **2.1.4.3 Bioquímica**

El resfriado común, al ser de origen viral, no suele requerir estudios bioquímicos específicos. Sin embargo, si hay sospecha de infección bacteriana secundaria o deshidratación, se solicitan:

Proteína C reactiva (PCR): Suele estar normal o ligeramente elevada en infecciones virales.

Procalcitonina: Normal en infecciones virales, pero elevada en infecciones bacterianas.

Gasometría arterial: En casos graves con complicaciones respiratorias, para evaluar el intercambio gaseoso.

#### **2.1.4.4 Biometría Hemática (BH)**

La biometría hemática en el resfriado común suele mostrar:

Leucocitos normales o ligeramente elevados: El resfriado viral no suele causar leucocitosis significativa.

Linfocitosis leve: Común en infecciones virales.

Sin desviación a la izquierda: Esto es característico de infecciones bacterianas, no del resfriado común.

#### **2.1.4.5 Química Sanguínea (QS)**

En el resfriado común, la QS suele ser normal. Sin embargo, si hay deshidratación por fiebre o disminución de la ingesta de líquidos, pueden observarse:

Aumento leve de urea y creatinina: Por deshidratación leve.

Glucosa normal: A menos que el paciente tenga diabetes o factores de riesgo metabólico.

### **2.1.5. Tratamiento . (Guía de práctica clínica Faringoamigdalitis)**

#### **2.1.5.1 Tratamiento Farmacológico y No Farmacológico del Resfriado Común**

El resfriado común es una de las infecciones virales más frecuentes y, aunque generalmente es autolimitado, puede generar molestias importantes. El tratamiento tiene

como objetivo aliviar los síntomas, ya que no existe una cura directa para la infección viral. A continuación se detallan los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos más comunes para el manejo del resfriado común, junto con sus ventajas y desventajas.

#### 2.1.5.2 Tratamiento Farmacológico del Resfriado Común

Aunque no existen medicamentos específicos para curar el resfriado común, diversos fármacos se utilizan para aliviar los síntomas asociados, como la congestión nasal, la fiebre, el dolor de garganta y la tos.

##### *1. Descongestionantes Nasales*

Los descongestionantes como la **pseudoefedrina** y la **fenilefrina** son comúnmente utilizados para aliviar la congestión nasal.

###### **Ventajas:**

- **Eficacia rápida** en la reducción de la congestión nasal.
- Son especialmente útiles para aliviar la dificultad para respirar y la sensación de obstrucción en la nariz.

###### **Desventajas:**

- Pueden causar efectos secundarios como **aumento de la presión arterial**, insomnio, nerviosismo y palpitaciones, especialmente en personas con hipertensión.
- El uso prolongado de descongestionantes nasales tópicos (sprays nasales) puede causar **efecto rebote** (congestión más severa cuando se interrumpe el uso).

##### *2. Antihistamínicos*

Los antihistamínicos, como **difenhidramina** (Benadryl) o **loratadina**, se utilizan para aliviar los síntomas de secreción nasal, estornudos y ojos llorosos.

###### **Ventajas:**

- Son efectivos para tratar los síntomas alérgicos y estacionales que pueden empeorar un resfriado.
- Algunos antihistamínicos, como la difenhidramina, también tienen un efecto sedante, lo que puede ayudar a dormir mejor en la noche.

### Desventajas:

- Los antihistamínicos de primera generación pueden causar **somnolencia, sequedad de boca, visión borrosa y estreñimiento**.
- Los antihistamínicos no son muy efectivos para tratar la congestión nasal.

### 3. Analgésicos y Antipiréticos

Los **analgésicos y antipiréticos**, como el **paracetamol** y los **antiinflamatorios no esteroides (AINEs)** como el **ibuprofeno**, son utilizados para aliviar el dolor de garganta, la fiebre y los dolores musculares.

### Ventajas:

- **Reducción de fiebre** y alivio de los **dolores musculares y de cabeza** asociados con el resfriado.
- El **paracetamol** es generalmente bien tolerado, y el **ibuprofeno** tiene un efecto antiinflamatorio adicional.

### Desventajas:

- El **ibuprofeno** puede irritar el estómago y causar úlceras si se usa en exceso o en personas con antecedentes de problemas gástricos.
- El uso excesivo de **paracetamol** puede dañar el **hígado**.
- No trata la causa del resfriado, solo los síntomas.

### 4. Jarabes y Medicamentos para la Tos

Los medicamentos para la tos, como el **dextrometorfano** (suprime la tos) o **guaifenesina** (expectorante), son comúnmente utilizados en combinación con otros medicamentos para aliviar la tos asociada al resfriado.

### Ventajas:

- Los **antitusígenos** como el **dextrometorfano** pueden ayudar a reducir la frecuencia de la tos seca y molesta, mejorando el descanso.
- Los **expectorantes** como la **guaifenesina** ayudan a aflojar las mucosidades y facilitan la eliminación de flemas.

### Desventajas:

- El **dextrometorfano** puede causar efectos secundarios como somnolencia y mareos.
- Los **expectorantes** pueden causar malestar estomacal si no se toman con suficiente agua.
- No hay evidencia sólida de que los **expectorantes** sean muy efectivos en el tratamiento de la tos asociada al resfriado común.

## 5. Suplementos de Vitamina C y Zinc

El **zinc** y la **vitamina C** son populares como suplementos para reducir la duración y severidad del resfriado.

### Ventajas:

- Algunos estudios sugieren que el **zinc** puede reducir la duración del resfriado y mejorar la respuesta inmune.
- La **vitamina C** se ha asociado con una reducción leve en la duración de los resfriados, aunque los resultados son mixtos.

### Desventajas:

- Los **suplementos de zinc** pueden causar efectos secundarios como **náuseas** y malestar estomacal si no se toman con alimentos.
- El uso excesivo de **vitamina C** puede causar **diarrea**.

### 2.1.5.3 Tratamiento No Farmacológico del Resfriado Común

El tratamiento no farmacológico se enfoca en aliviar los síntomas y mejorar el bienestar general durante un resfriado. Estas opciones son a menudo complementarias y pueden ser útiles para aquellos que prefieren evitar el uso de medicamentos.

#### 1. Descanso Adecuado

El descanso es esencial para que el cuerpo pueda fortalecer el sistema inmunológico y combatir la infección.

### Ventajas:

- Ayuda a **recuperar energía**, reduce la fatiga y permite que el cuerpo se recupere más rápidamente.

- El descanso adecuado puede **mejorar la función inmunológica**, ayudando a combatir la infección de manera más eficiente.

**Desventajas:**

- En algunas personas, el reposo excesivo puede causar **inactividad muscular** o problemas asociados con la falta de movimiento.

**2. Hidratación Adecuada**

Es fundamental mantenerse bien hidratado durante un resfriado. Beber agua, caldos y líquidos cálidos puede ayudar a calmar la garganta y a mantener la mucosa nasal hidratada.

**Ventajas:**

- Ayuda a mantener las mucosas **hidratadas**, lo que facilita la eliminación de las mucosidades.
- Beber líquidos calientes, como té o caldo, puede aliviar la **irritación de garganta** y proporcionar consuelo.

**Desventajas:**

- Si bien la hidratación es beneficiosa, **beber en exceso** puede llevar a molestias gastrointestinales si no se controla.

**3. Humidificación del Aire**

El uso de un **humidificador** en el ambiente o la inhalación de vapor pueden aliviar la congestión nasal y la sequedad de la garganta.

**Ventajas:**

- Un **humedecedor de aire** ayuda a mantener las vías respiratorias hidratadas y puede aliviar la congestión nasal.
- La **inhalación de vapor** alivia la irritación de garganta y despeja las vías respiratorias superiores.

**Desventajas:**

- Un humidificador mal mantenido puede promover el crecimiento de **moho** o bacterias en el aire.

- El vapor caliente puede **quemar** las vías respiratorias si no se usa adecuadamente.

#### **4. Gárgaras con Agua Salada**

Las gárgaras con **agua salada tibia** son una opción tradicional para aliviar el dolor de garganta.

**Ventajas:**

- La sal puede ayudar a reducir la **inflamación** y el dolor de garganta.
- Es una opción económica y de fácil acceso.

**Desventajas:**

- Las gárgaras pueden no ser agradables para algunas personas y deben realizarse con cuidado para evitar la **ingesta accidental** de agua salada.

#### **5. Alimentación Saludable**

Mantener una dieta rica en nutrientes, especialmente alimentos ricos en vitamina C (cítricos, kiwis, fresas) y antioxidantes (frutos rojos, espinacas), puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.

**Ventajas:**

- Los alimentos ricos en **vitamina C** pueden apoyar el sistema inmunológico.
- Los **caldos calientes** pueden proporcionar alivio para la congestión nasal y la garganta irritada.

**Desventajas:**

- Si bien una buena nutrición es esencial, no hay evidencia concluyente de que ciertos alimentos prevengan o curen un resfriado.

#### **2.1.6 Pronóstico.**

##### 2.1.6.1 Pronóstico de Vida y Función del Resfriado Común

El **resfriado común** es una infección viral frecuente que afecta a las vías respiratorias superiores, como la nariz y la garganta. Aunque puede ser molesto y generar síntomas

incómodos, el pronóstico de vida del resfriado común es generalmente **muy bueno**, ya que es una enfermedad **autolimitada** que suele resolverse por sí sola en un plazo de 7 a 10 días. No pone en riesgo la vida de las personas, y en su mayoría, las personas sanas se recuperan completamente sin complicaciones graves.

#### 2.1.6.2 Pronóstico del Resfriado Común

El pronóstico del resfriado común es, en términos generales, **muy favorable**. La mayoría de las personas experimentan una **recuperación completa** dentro de una o dos semanas. Los síntomas pueden incluir congestión nasal, dolor de garganta, tos, estornudos, dolor de cabeza y fatiga, pero rara vez causan complicaciones graves. Si bien la enfermedad es molesta, el riesgo de muerte o de daño prolongado a la salud es prácticamente inexistente.

En **adultos sanos**, los resfriados comunes no tienden a ser peligrosos. Sin embargo, pueden desencadenar complicaciones menores, como una **sinusitis** (inflamación de los senos paranasales) o una **otitis media** (infección del oído medio). En estos casos, los síntomas pueden persistir por más tiempo, pero generalmente se resuelven con tratamiento médico adecuado.

#### 2.1.6.3 Factores que Pueden Afectar el Pronóstico

El pronóstico del resfriado común puede ser más complicado en ciertos grupos de personas, como:

1. **Niños pequeños y adultos mayores:** Aunque no es común, los niños muy pequeños y los adultos mayores pueden experimentar un **mayor riesgo de complicaciones**, como infecciones secundarias de las vías respiratorias (como la bronquitis o la neumonía), especialmente si tienen un sistema inmunológico debilitado.
2. **Personas con enfermedades crónicas:** Aquellos con **enfermedades respiratorias crónicas**, como el asma o la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), pueden sufrir exacerbaciones o empeoramiento de sus síntomas respiratorios debido a un resfriado común.
3. **Personas inmunocomprometidas:** Las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como aquellas que están bajo tratamiento de quimioterapia, trasplantadas de órganos o que viven con VIH/SIDA, pueden enfrentar un riesgo mayor de complicaciones graves debido a un resfriado común.

#### 2.1.6.4 Función y Evolución del Resfriado Común

El **resfriado común** tiene un curso típico de evolución. Después de la exposición al virus, los síntomas comienzan a aparecer en un periodo de **2 a 3 días**. Los primeros

síntomas suelen ser una sensación de picor o irritación en la garganta y una secreción nasal. Posteriormente, se pueden desarrollar otros síntomas como tos, dolor de cabeza y fiebre leve.

El virus **generalmente no afecta la función respiratoria de manera significativa** en individuos sanos. Aunque puede causar malestar general y fatiga, la capacidad respiratoria no se ve comprometida gravemente. La mayoría de las personas continúan con sus actividades diarias, aunque a un ritmo más lento debido a los síntomas.

A medida que la infección progresá, el cuerpo comienza a luchar contra el virus, lo que lleva a la **mejora de los síntomas** en un plazo de 7 a 10 días. Es en este periodo cuando la **función inmunológica** del cuerpo está trabajando activamente para erradicar el virus.

#### 2.1.6.5 Vida del Resfriado Común

El resfriado común generalmente no interfiere de manera permanente con la vida de una persona. Dado que la mayoría de los resfriados se resuelven en una o dos semanas, la vida del paciente no se ve afectada a largo plazo. Es importante tener en cuenta que, aunque el resfriado se resuelve rápidamente, las personas infectadas son contagiosas durante los primeros 2-3 días de síntomas, lo que aumenta el riesgo de propagar el virus a otras personas.

En resumen, el resfriado común tiene un pronóstico de vida **muy bueno** para la mayoría de las personas. No se considera una enfermedad grave, y las personas generalmente se recuperan sin efectos a largo plazo. Sin embargo, algunas personas con condiciones preexistentes o sistemas inmunitarios debilitados deben tener precaución, ya que pueden estar en mayor riesgo de complicaciones.

#### 2.1.6.1. Drogas estimulantes:

“Reconocidas por el incremento de energía, concentración, ritmo cardiaco, fluidez, sensación de confianza y euforia. Una de ellas es la nicotina, con capacidad de ligar receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChRs), ubicados en las terminales pre sinápticas modulando la liberación de neurotransmisores y síntesis de dopamina, incrementando la tirosina Hidroxilasa y su liberación mediante la activación de AchRs somatodendrítico en rutas dopaminérgicas nigroestriada, mesolimbica y núcleo accumbens”. (Oscar Erazo Santander, 2020.)

Estas drogas son frecuentemente consumidas ya que generan un incremento de energía, concentración, ritmo cardiaco, fluidez y sensación de confianza, una droga estimulante y muy conocida es la nicotina.

#### **2.1.6.2. Drogas depresivas:**

“Drogas depresivas, caracterizadas por la acción de relajación, desinhibición, disminución motriz y cognitiva, efecto sedante. Como el alcohol o etanol que incrementa la inhibición por la ligación con los receptores GABA-A e incrementando la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y disminuye la actividad ex citatoria por receptores de glutamato y NMDA. Su abstinencia produce temblores, transpiración, vomito, convulsiones, delirium tremens con reducción del volumen cerebral con consecuencia psiquiátrica y neurológica”. (Oscar Erazo Santander, 2020.)

Este tipo de drogas se caracteriza por su acción de relajación, desinhibición, disminución motriz, cognitiva y efecto sedante. Ejemplo de estas drogas depresivas son: el alcohol o etanol los cuales aumentan la inhibición por ligando de los receptores GABA-A y realiza un incremento en la liberación de dopamina (en el núcleo accumbens) disminuye la actividad excitatoria por receptores de glutamato y NMDA, esto provoca en los consumidores síntomas como temblores, transpiración, vomito, convulsiones, reducción del volumen cerebral.

#### **2.1.6.3 Drogas hipnóticas y sedantes:**

“Se caracterizan por su efecto sedante, amnésico y de descoordinación motriz y cognitiva. Entre ellas las benzodiacepinas que facilitan la apertura de GABA del canal de cloro GABA-A. O los barbitúricos que enlazan en un sitio específico el ion cloro GABA, incrementando la conductancia del cloro, además estimula el sistema meso límbico y produce cambios en los receptores de GABA-A controlando la excitabilidad neuronal en todas las regiones del cerebro. En abstinencia hay ansiedad, insomnio, convulsión, su uso prolongando daña funciones cognitivas” (Oscar Erazo Santander, 2020.)

Estas drogas se caracterizan por sus diversos efectos sedantes, amnésicos, de descoordinación motriz y cognitiva. En estas drogas tenemos a las benzodiacepinas las cuales facilitan una apertura de GABA aumentando la conductividad del cloro, estimulando al sistema límbico y produciendo cambios en los receptores GABA-A teniendo como resultado la excitabilidad neuronal en las regiones del cerebro.

#### **2.1.6.4. Drogas alucinógenos:**

“Los alucinógenos son un grupo diverso de drogas que alteran la percepción (conciencia de los objetos y condiciones circundantes), los pensamientos y los sentimientos. Estas drogas causan alucinaciones, o sensaciones y visiones que parecen reales pero que no lo son. Los alucinógenos se encuentran en algunas plantas y hongos (o en sus extractos) o pueden ser artificiales”. (Johnson, 2016)

### ¿Cómo afectan los alucinógenos al cerebro?

Las investigaciones científicas sugieren que los alucinógenos funcionan, en parte, perturbando temporalmente la comunicación entre diferentes sistemas químicos en el cerebro y en la medula espinal. Algunos alucinógenos interfieren con la acción del químico cerebral la serotonina que regula:

- Animo.
- Percepción sensorial.
- Sueño.
- Hambre.
- Temperatura corporal.
- Conducta sexual.
- Control muscular

Otros alucinógenos interfieren con la acción del químico cerebral glutamato, el que regula:

- Percepción del dolor.
- Reacciones al ambiente.
- Emociones.
- Aprendizaje y memoria.

Los alucinógenos son aquellas sustancias y/o drogas las cuales modifican la conciencia de los objetos, pensamiento y los sentimientos. Estas drogas que como su nombre lo dicen causan alucinaciones, sensaciones y visiones ficticias. Es importante mencionar que podemos encontrar a estos en plantas u hongos específicamente en sus extractos o de igual manera pueden ser alucinógenos artificiales.

Estos alucinógenos participan en el consumidor de forma que perturba la comunicación entre diferentes sistemas que van hacia el cerebro y la medula espinal e incluso existen diversos alucinógenos que interfieren en la acción químico cerebral de la serotonina la cual tendrá diferentes signos y síntomas los cuales son:

- Animo.
- Sueño.
- Hambre.
- Temperatura corporal.
- Conducta sexual.
- Control muscular.

### 2.1.6.5. Drogas opioides:

“Como la morfina que es un alcaloide del opio, la heroína que es un derivado del opio y la metadona que es un sustitutivo de la heroína. Su acción es como agonista de los receptores de opioides muy delta, desensibilizando a corto plazo los receptores de opioides, además de readaptaciones intracelulares. Produce euforia, analgesia y sedación, su tolerancia es rápida, su abstinencia superior a 36 horas es de gravedad, con contracciones, aumento de

tasa cardiaca, perturbación de sueño, los síntomas intensos duran 72 horas y disminuyen después de 5 a 10 días". (Oscar Erazo Santander, 2020.)

Las drogas opioides son aquellos derivados de un opio y una metadona (la cual es un sustituto de la heroína), la metadona tiene acción antagonista de los receptores opioides muy delta los cuales producen sentimientos excesiva, analgesia y sedación la tolerancia es rápida y su acción es superior a 36 horas de gravedad en las cuales se puede haber contracciones, aumento cardiaco, alteración del sueño, estos síntomas pueden ser intensos durante 72 horas y pueden llegar a controlarse o disminuir después de 5 a 10 días.

#### **2.1.6.6. Por su origen (naturales y sintéticas).**

En esta clasificación agrupa a las drogas en función de cómo se sintetizan, el argentino Eduardo Barreiro (2007) especialista nacional avanzado en la lucha contra el narcotráfico realiza esta clasificación, así tenemos:

- ⇒ Drogas naturales: Son aquellas que se recogen directamente de la naturaleza para ser consumidas por el individuo como la marihuana y sus derivados; la mezcalina y el opio. Lo "natural hace referencia a que el principio activo de la droga está presente en la materia vegetal.
- ⇒ Drogas semi-sintéticas: Son obtenidas por síntesis parcial a partir de sustancias naturales, como en el caso de la heroína o la base de cocaína.
- ⇒ Drogas sintéticas: Son aquellas sustancias producidas o elaboradas solo en laboratorio, como el "éxtasis".

De acuerdo a las drogas por su origen encontramos tres distintas clasificaciones:

1. Drogas naturales: Estas drogas son aquellas que son extraídas de la naturaleza entre ellas tenemos a la marihuana. Las drogas naturales se refieren a que el principio activo de esta se encuentra en materia vegetal.
2. Las drogas semi-sintéticas: Estas drogas se obtienen de una parte de sustancias naturales.
3. Drogas sintéticas: Estas drogas son aquellas sustancias que elaboran o procesan por lo regular son elaboradas en laboratorios, en ejemplos tenemos al éxtasis.

#### **2.1.6.7. Por su acción farmacológica:**

"La clasificación de las drogas de acuerdo con su acción farmacológica ayuda a reflexionar los datos presentados y a responder a la importancia de analizar los datos epidemiológicos de manera crítica, analítica y reflexiva. Las drogas se pueden clasificar como Psicoestimulantes, Depresoras y Psicodislépticos, y llama la atención que el cannabis y algunas drogas de síntesis son clasificadas como Psicodislépticos, donde drogas sintéticas

tendrían un perfil mixto, siendo psicoestimulantes y psicodisléptico, y el cannabis también de perfil mixto sería psicodisléptico y depresor”. (Alvarado., 2020).

De acuerdo a su acción farmacológica las drogas son analizadas, criticadas y reflexivas en un laboratorio con la finalidad de poder conocer su principio activo y clasificarlas, algunas de ellas son las psicoestimulantes, depresoras y Psicodislépticos y el cannabis.

#### **2.1.6.8. Por su consideración sociológica:**

“Se considera consumo problemático el que realizan las personas calificadas como consumidores abusivos o dependientes. El consumo problemático de drogas tiende a estar relacionado con dificultades personales o familiares y con circunstancias sociales y económicas adversas. Estas circunstancias son a su vez factores que agravan el consumo porque son resultado del propio consumo; es un círculo vicioso: los problemas les llevan al consumo y el consumo les genera problemas o los acrecienta”. (Bello Martha Beatriz Baquerizo, 2020).

Por su consideración sociológica nos quiere decir que son todas aquellas drogas las cuales son de mayor problemática para los consumidores dependientes o abusivos. Este consumo problemático llega a estar relacionado con diversas dificultades como personales, familiares, sociales económicas entre otras.

#### **2.1.6.9. Por su peligrosidad para la salud.**

“Condición que sucede a la administración de una sustancia psicoactiva y que produce perturbaciones a nivel cognitivo, perceptivo, afectivo, de conciencia, conductual, o relacionado con otras funciones y reacciones psicofisiológicas. Las perturbaciones se relacionan con los efectos farmacológicos agudos de la sustancia y las reacciones aprendidas por ésta y se resuelven con el tiempo, con recuperación completa, excepto si hay daños en tejidos o algunas otras complicaciones. Las complicaciones pueden incluir: trauma, inhalación de vómito, delirio, coma y convulsiones, entre otras complicaciones médicas. La naturaleza de éstas depende de la clase farmacológica de la sustancia y de su vía de administración”. (Bello Martha Beatriz Baquerizo, 2020).

De acuerdo a la peligrosidad que las drogas provocan a la salud, son aquellas condiciones o reacciones las cuales se presentan al momento en el cual se realiza la administración de la droga, existen diversos factores los cuales son dañinos para la salud, en ellos encontramos: produce perturbaciones a nivel cognitivo, perceptivo, afecciones, de conciencia, conductual. Entre estas reacciones puede presentarse un trauma, inhalación de vómito, como, convulsiones y diversas reacciones médicas, es importante tener en cuenta

que estos efectos serán mediados por la clase de droga que se utiliza, la vía y por supuesto la dosis.

#### **2.1.7. Drogadicción:**

“La drogadicción actualmente es una problemática social a nivel mundial que produce alteraciones orgánicas en el ser humano que las ingiere, sobre todo a los más vulnerables como los adolescentes, afectando a la familia y al entorno en el que se desarrolla como el lugar donde vive o estudia y aumentando la deserción estudiantil”. (Bello Martha Beatriz Baquerizo, 2020).

De acuerdo a la drogadicción, aunque es un tema del cual se habla hace muchísimo tiempo sigue siendo un problema actual en adolescentes a nivel mundial, este problema llega a ser principalmente del consumidor ya que al ingerir o consumir la droga provoca alteraciones orgánicas, se dice que las personas más vulnerables a sufrir de drogadicción son los adolescentes sin embargo no solo ellos llegan a sufrir las consecuencias del consumo sino que de igual manera se afecta la familia, el lugar donde vive, las amistades, las relaciones sentimentales y no solo eso sino que llega a afectar al consumidor en todos los hábitos que realiza con frecuencia en su día a día, pudiendo haber un desinterés de las cosas o emociones y sentimientos encontrados.

#### **2.1.8. Definición:**

“El porqué del consumo de las drogas no tiene respuestas fáciles. Personas de todos los extractos sociales usan drogas. Razones y motivaciones diversas conducen a su empleo: evasión, afán de experiencias nuevas, simple curiosidad, hostilidad o rebeldía, impotencia para resolver conflictos; dependencia para olvidar la miseria y el dolor”. (Julio., 2019)

“El placer o escapar de la clandestinidad es ser drogadicto, no les interesa la victoria, Y bien sea por presión del grupo o por curiosidad, hay una ausencia de voluntad. Hay quienes usan drogas por razones específicas; estudiantes que se suministran anfetaminas para resistir el cansancio en los estudios y exámenes, profesionales que usan para mantener energías, o simplemente lo consumen como diversión y son los que están en camino fatal a la toxicomanía, un grado de dependencia psicológica y física, con las consecuencias terribles que hemos considerado”. (Julio., 2019)

“Una causa profunda es la que la persona busca la droga para salvar su estado de culpa. La juventud se ve absorbida por una culpa colectiva de destrucción, de guerra de odio y de injusticia, y busca su escape en las drogas. En la historia del adicto, se puede encontrar la verdad de una inestabilidad familiar desgarrada por la ausencia de padres, por el abandono sin infancia, la ambientación, entre otras. La droga necesita una personalidad deficiente e inmadura, un ambiente adverso y una realidad de frustración, sin liberación ni esperanza”. (Julio., 2019)

La drogadicción son aquellas personas las cuales deciden consumir drogas o ser adictos a una sustancia psicoactiva, actualmente la drogadicción es un problema mundial, es muy común que los adolescentes o adultos decidan consumir drogas para poder escapar de alguna situación en específico, se deduce que a un drogadicto no le importa lo que pasa a su alrededor sin embargo también se deduce que existen diversas personas las cuales usan drogas por algún beneficio en específico por ejemplo para resistir los desvelos o el cansancio debido a los estudios, exámenes, de igual manera los adultos (profesionales) pueden hacer uso de estas drogas para mantener energía. Debemos de tomar en cuenta que habrá múltiples factores por el cual una persona decida consumir drogas.

### **2.1.9. Costo económico.**

“El consumo de drogas no puede ser visto en forma aislada, motivado a que existe una gran red de narcotráfico y de lavado de dinero a nivel mundial que se beneficia, los capitales en los bancos provenientes de estupefacientes es problema de todos, es un fenómeno social que debe ser atacado desde estrategias sociales y políticas, para que estos jóvenes tengan una mayor calidad de vida y sientan apoyo al contar con políticas públicas encaminadas a afrontar el consumo de drogas en adolescentes. Aunado a esto la prevención es un proceso activo de política social tendente a mejorar en forma integral la vida de los adolescentes fomentando el autocontrol y la resistencia colectiva ante la resistencia de las drogas. “La prevención de drogodependencia es un proceso activo de iniciativas tendentes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos fomentando el autocontrol individual y resistencia colectiva ante la oferta de drogas”. En opinión de la autora la prevención es de suma importancia porque ayuda a que los jóvenes se sientan apoyados por políticas sociales en aras de rescatarlos de la drogadicción y reintegrados para una vida digna. En su discurso enfatizo en la importancia de diferenciar los tipos de comportamiento de los individuos desde la primera exposición a la oportunidad del consumo, primera experimentación con drogas y el posible rumbo del uso-abuso dependencia, ya que uno de estos grupos necesita una respuesta diferente prevención, tratamiento, rehabilitación”. (Martinez., 2020)

Podemos comprender y deducir que el costo de las drogas es algo que casi no se toma en cuenta, creo que esto es muy importante porque al llegar a convertirse en drogodependientes pueden buscar diversas maneras y estrategias para poder conseguir el dinero para consumo de drogas. Para ello es importante que se realice

### **2.2. Costo social:**

“El consumo de drogas en jóvenes adolescentes está enmarcada como una problemática de la sociedad de nuestros días, es un hecho real que genera múltiples consecuencias que involucran a los adolescentes, presentándose como objetivo general del presente artículo describir la política social y comunitaria para afrontar el consumo de drogas en los jóvenes adolescentes. Este es el principal problema de salud pública en la mayoría de los países, motivado a que la ingesta de drogas produce más muertes que cualquier otra causa. En consecuencia, con el consumo de drogas se describen problemas de orden sanitario, económico, cultural y de inseguridad, este flagelo es un problema colectivo, por cuanto muchos países han adoptado políticas sociales de prevención y rehabilitación. La investigación fue abordada a través de un diseño documental, apoyada en referentes teóricos que validan el tema de estudio. Luego del abordaje reflexivo se concluye que los jóvenes consumen drogas motivado a diversos factores económicos y sociales, donde la familia y los valores transmitidos desde el hogar juegan un papel fundamental en las decisiones de los jóvenes”. (Martinez., 2020)

### **2.3. Fisiología:**

“Mecanismos de regulación del placer: Corteza Prefrontal Entre las funciones de la CPF están el control de la conducta y el control cognitivo (la habilidad para llevar a cabo conductas dirigidas por metas, ante la presencia de estímulos sobresalientes y competitivos con la tarea). Diferentes subregiones de la CPF se han asociado con la adicción, la CPF medial (CPFm) y la corteza orbitofrontal (COF). La CPFm está involucrada en la modulación del sistema del placer. Recibe proyecciones dopaminérgicas del ATV y glutamatérgicas de estructuras de los núcleos de la base, a través del tálamo dorsomedial33. Las eferencias de la CPFm son glutamatérgicas para el ATV, para el estriado dorsal y para el NAc33. De tal modo que la activación de la CPFm resulta en la activación del ATV y, consecuentemente, del NAc. Por otro lado, la COF recibe entradas de cortezas sensoriales asociativas, del hipotálamo y de la amígdala; y tiene una comunicación recíproca con la CPFm34. Estas regiones responden de manera diferente a la administración aguda de anfetamina de manera sistémica. Esto es, la CPFm (más ejecutiva) disminuye su frecuencia de disparo, mientras que la orbitofrontal (COF; más límbica) la aumenta34. Cuando se repite la administración de la droga, la respuesta excitadora de la COF y la inhibidora de la CPm aumentan34, sugiriendo que ha ocurrido plasticidad en estas regiones. Estos cambios también se asocian con una baja eficiencia en memoria de trabajo34, indicando una alteración en conductas dirigidas por metas2, 34. Es frecuente observar en sujetos adictos, evaluados en tareas de toma de decisiones en que se busca obtener mayor cantidad de reforzadores a largo plazo (p. ej., Gambling task tarea de apuestas), que eligen obtener reforzadores a corto plazo, a pesar de saber que esa estrategia no los lleva a obtener ganancias a largo plazo35. Esto sugeriría que las modificaciones que ocurren durante la adicción en la CPF18, 36, alterando su función, hacen que el sujeto sea vulnerable a la recaída al no considerar las consecuencias a largo plazo (impulsividad)”. (Garcia., 2015)

#### **2.4. Fisiopatología:**

“Los mecanismos de la dependencia física son variados y dependen de las drogas utilizadas y de los órganos y sistemas involucrados. Generalmente el sistema nervioso central se encuentra especialmente afectado. En tal sentido diversos neurotransmisores juegan un rol importante en la generación de la dependencia física y el síndrome de abstinencia. Puede decirse que el mecanismo principal de la dependencia física, neuroadaptación o contradaptación de mecanismos neuronales que originan un estado definido como de: hiperexcitabilidad latente. Este es un fenómeno que se pone de manifiesto ante la supresión de la droga que origina efectos "rebotes" o de una respuesta exagerada. En general el mecanismo íntimo de la dependencia física y del síndrome de abstinencia es difícil de explicar. Para cada tipo celular o tejido afectado y para cada droga en especial, los cambios son complejos e involucran neurotransmisores diferentes” (Garcia., 2015)

- 1) La droga puede provocar la inhibición de una enzima necesaria para la síntesis de un neurotransmisor, enzima cuya producción es autorregulada por la concentración del propio neurotransmisor.
- 2) Al estar inhibida la enzima, se reduce la síntesis del neurotransmisor.
- 3) Esto origina por autorregulación, una inducción enzimática e incremento de la síntesis de la enzima para reparar la situación.
- 4) Las enzimas de nueva producción son a su vez inhibidas parcialmente por la droga.
- 5) En el balance, la síntesis del neurotransmisor, aunque comprometida se sigue efectuando.
- 6) Ante la supresión brusca de la droga se crea una situación especial a nivel celular ya que existe una gran cantidad de la enzima que queda en disponibilidad para incrementar rápidamente la síntesis del neurotransmisor.
- 7) Se desarrollan entonces efectos "rebote" ocasionados por el exceso del neurotransmisor.

#### **2.5. Tratamiento:**

“En este apartado deberemos tener en cuenta que el problema puede provenir de diferentes sustancias, y que cada una de ellas tendrá un abordaje específico. Sin embargo también en este caso observamos unas pautas comunes que nos servirán de patrón para todas ellas. Así, podremos establecer que el tratamiento constará de una parte farmacológica y una psicoterapéutica, y se completará con un abordaje socioeducativo que restaure una adecuada relación del paciente con la familia y el entorno, y que favorezca la recuperación de un proceso educativo normalizado. Tradicionalmente, en el tratamiento de las drogodependencias se habla de tres momentos o fases secuenciales, aunque en ocasiones también se pueden superponer. En una primera fase, que denominamos «desintoxicación», se aborda la sintomatología de abstinencia, tanto física como psíquica, basándose en la implementación de una terapia farmacológica que ayude a superar las molestias iniciales

derivadas del cese del consumo. Le sigue la fase de deshabitación, es decir, una intervención destinada a romper con el hábito del consumo y cambiar o eliminar conductas relacionadas con él, ayudando al paciente a superar las dificultades que aparecerán durante todo el tratamiento. Concluye el tratamiento con la fase de rehabilitación, destinada a recuperar las relaciones familiares y amistosas, reiniciar las actividades deportivas o de ocio y tiempo libre, sin olvidar en estos pacientes un rendimiento escolar acorde con sus capacidades”. (Marcos Flores, 2020).

## **2.6. Pronostico:**

“El desarrollo de la recaída es característica a las adicciones y no debe verse como una pérdida de la fase terapéutica. Se considera guiar el sistema para el cuidado de estos factores o para la consecución de habilidades personales y recursos dentro del tratamiento para confrontar posibles recaídas; cuanto mayor sea la percepción relacionado a esto, existe mayor probabilidad de saber cómo proceder con antelación para evitarlos. Martínez, Vilar, Lozano, y Verdejo (2018), mencionan que las creencias básicas que el adolescente adicto persigue, está el querer mantener un equilibrio psicológico y emocional creando la expectativa que el uso de drogas mejora su capacidad social e intelectual, Además cabe recalcar que dentro de este tipo de pensamiento existe la idea de que la droga brinda un poder energético o brinda más fuerza causando la sensación de poder. Cabe recalcar que en la actualidad que ha creado un auge dentro de ciertos tipos de medicina alterna que crea expectativa indicando que el uso específico de cierta droga calma el dolor o alivia la ansiedad, la tensión y la depresión creando aun mayor dependencia de la misma. El uso de drogas provoca una serie de conflictos internos (emocionales) y externos (conductuales), en donde se puede evidenciar ausentismo académico o escaso interés en los estudios, se acentúan mayormente los conflictos familiares, además de traer consigo problemas en la salud, para los jóvenes reincidentes les cuesta más reingresar al tratamiento; existiendo dos grandes complicaciones, como la cronicidad y la dependencia haciendo que el pronóstico sea más agravado”. (Chavez., 2020.)

## **2.7. Causas:**

### **2.7.1. Curiosidad:**

“A este respecto, los adolescentes constituyen una población particularmente vulnerable, debido a la fuerte influencia que tiene sobre ellos la presión de sus amigos y compañeros. Es más probable, por ejemplo, que se involucren en comportamientos atrevidos o de desafío”. (Marcos Flores, 2020).

#### **2.7.2. Problemas familiares:**

“A este respecto, los adolescentes constituyen una población particularmente vulnerable, debido a la fuerte influencia que tiene sobre ellos la presión de sus amigos y compañeros. Es más probable, por ejemplo, que se involucren en comportamientos atrevidos o de desafío”. (Marcos Flores, 2020).

#### **2.7.3. Influencia en el entorno en el que se desarrollan los adolescentes:**

“La falta de apoyo familiar, al que se añade la falta de cariño de los padres, seguido de la influencia de amigos, promesas de una vida con menos dificultad, la facilidad para conseguir dinero, la curiosidad y el alejamiento de la escuela. La influencia del ambiente en el refuerzo positivo para mantener el consumo de drogas. Se evoca la necesidad de ser ayudados y de encontrar caminos para realizar actividades propias de su edad, como por ejemplo frecuentar la escuela. También refleja un futuro incierto, pero con esperanza de que pueda ser diferente un día”. (Hugo Hidalgo Hidalgo, 2018).

#### **2.7.4. Problemas familiares/carencia familiar:**

“A este respecto, los adolescentes constituyen una población particularmente vulnerable, debido a la fuerte influencia que tiene sobre ellos la presión de sus amigos y compañeros. Es más probable, por ejemplo, que se involucren en comportamientos atrevidos o de desafío”. (Marcos Flores, 2020).

#### **2.7.5. Para sentirse bien:**

“La mayoría de las drogas de abuso producen sensaciones intensas de placer. Esta sensación inicial de euforia va seguida de otros efectos, que difieren según el tipo de droga usada. Por ejemplo, con los estimulantes, como la cocaína, tras el efecto de euforia sobrevienen sensaciones de poder, autoconfianza y mayor energía. Por el contrario, a la euforia producida por los opiáceos, como la heroína, le siguen sensaciones de relajamiento y satisfacción”. (Marcos Flores, 2020).

#### **2.7.6. Para sentirse mejor:**

“Algunas personas que sufren ansiedad o fobia social, trastornos relacionados con la angustia o la depresión, comienzan a abusar de las drogas para intentar disminuir estos sentimientos. El estrés puede ejercer un papel importante para determinar si alguien comienza o continúa abusando de las drogas, así como en las recaídas en los pacientes que están recuperándose de su adicción”. (Marcos Flores, 2020).

### **2.7.7. Para rendir mejor:**

“La necesidad que sienten algunas personas de mejorar su rendimiento atlético o cognitivo con sustancias químicas puede desempeñar un papel similar en la experimentación inicial y abuso continuado de las drogas”. (Marcos Flores, 2020).

## **2.8. Signos y síntomas:**

### **2.8.1. Área mental:**

- ⇒ Cambios básicos en el modo de ser.
- ⇒ Incidentes cambios del ánimo inexplicables.
- ⇒ Indiferencia con relación a lo que lo rodea.

### **2.8.2. Familia:**

- ⇒ Actitud muy reservada.
- ⇒ Alejamiento de la familia.
- ⇒ Mayores conflictos en el hogar.

### **2.8.3. Escuela:**

- ⇒ Ausencia y llegadas tardes.
- ⇒ Disminución de las calificaciones.
- ⇒ Problemáticas de conducta.
- ⇒ Actitud negativa con relación a las actividades de la escuela.
- ⇒ Abandono de viejos amigos y viejas actividades.
- ⇒ Llamadas telefónicas o mensajes que encubren drogas.

### **2.8.4. Síntomas físicos.**

- ⇒ Enrojecimiento de los ojos.
- ⇒ Pupilas grandes.
- ⇒ Palidez, ojeras pronunciadas.
- ⇒ Sed intensa.
- ⇒ Piel caliente o enrojecida.
- ⇒ Taquicardia.
- ⇒ Confusión o desorientación.
- ⇒ Visiones.
- ⇒ Trastornos del apetito.
- ⇒ Pérdida de peso.
- ⇒ Trastornos del sueño.
- ⇒ Fatigabilidad o inquietud.

- ⇒ Dolores de cabeza, temblores.
- ⇒ Deterioro de la higiene personal.

## **2.9. Tipo de drogas más consumidas por adolescentes:**

### **2.9.1. Alcohol:**

“Es uno de los principales factores que conlleva a diversos tipos de enfermedades y lesiones, el consumo por momentos prolongados y en gran cantidad significa un grave riesgo para la salud, su consumo en la adolescencia puede ser nocivo ya que puede afectar tanto las estructuras como su funcionamiento, compromete las redes neuronales que subyacen a las habilidades cognitivas más complejas involucradas en el aprendizaje, 12 cognitivo, la memoria y algunas ejecuciones finas, por lo que el consumo de alcohol lleva a un impacto neurobiológico en la adolescencia”. (Casa., 2019.)

### **2.9.1. Tabaco:**

“Es una droga estimulante del SNC, uno de sus elementos es la nicotina, que tiene la capacidad adictiva muy grande, durante el encendido del tabaco se originan más de 4.000 productos tóxicos diferentes, dentro de los cuales se destacan los alquitranes, que son responsables de distintos tipos de cáncer; el monóxido de carbono, que favorece las enfermedades cardiovasculares; o irritantes, responsables de enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar”. (Casa., 2019.)

### **2.9.2. Marihuana:**

“Marihuana o más conocido como Cannabis posee alrededor de cuatrocientas sustancias químicas, entre esas cannabinoides. Cuando el cuerpo humano consume marihuana, produce síntomas característicos tales como enrojecimiento en los ojos, ya que los vasos sanguíneos se dilatan debido al aumento del ritmo cardíaco logrando que tenga dicha coloración. Otros de los efectos es la inflamación del cerebro causado por el compuesto 24 químico THC (Tetrahidrocannabinol), ya que este produce una leve inflamación en la zona cerebral encargada de coordinar los movimientos. Su sintomatología es temporal, sin embargo, su consumo masivo prolonga la afección por más tiempo. También ocasiona otras complicaciones tales como euforia, problemas de coordinación, inestabilidad, u otros”. (Milena Patricia Alvarado, 2020).

### **2.9.3. Cocaína:**

“Es una de las drogas ilícitas con graves complicaciones para el ser humano. Eleva las hormonas del sistema nervioso central tales como: noradrenalina y dopamina.

Palpitaciones fuertes, presión torácica, midriasis y depresión son los efectos que produce la sustancia psicoactiva en las personas que lo consume". (Milena Patricia Alvarado, 2020).

#### **2.9.4. Heroína:**

"La heroína es un alcaloide altamente aditivo que actúa principalmente en el Sistema Nervioso Central. Llega aproximadamente entre 15 a 25 segundos al cerebro, produciendo sintomatologías como la elevación de temperatura corporal, euforia, pérdida de sensibilidad motora, insuficiencia renal, enfermedad cerebral, necrosis muscular, entre otros". (Milena Patricia Alvarado, 2020).

#### **2.9.5. Alucinógenos:**

"Los alucinógenos son un grupo diverso de drogas que alteran la percepción (conciencia de los objetos y condiciones circundantes), los pensamientos y los sentimientos. Estas drogas causan alucinaciones, o sensaciones y visiones que parecen reales pero que no lo son. Los alucinógenos se encuentran en algunas plantas y hongos (o en sus extractos) o pueden ser artificiales. Por siglos, las personas han consumido alucinógenos más que todo como parte de rituales religiosos". (Milena Patricia Alvarado, 2020).

### **3. Adicción:**

"La adicción a las sustancias psicoactivas, es una pandemia mundial que ataca con mayor frecuencia a los adolescentes. Su intervención hasta el momento es infructuosa y actualmente el continente Sur Americano se enfrenta a un aumento desproporcionado de la epidemia y en medio de la incertidumbre que se tiene sobre la temática; notable por la ausencia de políticas claras que puedan reducir o acabar con la problemática. La adicción es un comportamiento progresivo con consumo de una o varias drogas, que al ser ingeridas en el organismo generan respuestas de alta sensación de placer y recompensa, modificando al mismo tiempo redes cerebrales a un nivel molecular y terminando con la destrucción y perversión del sistema nervioso central y de áreas encargadas en la realización de procesos neuropsicológicos básicos y superiores". (Oscar Erazo Santander, 2020.).

#### **3.1. Definición:**

"Es la necesidad de la droga de forma compulsiva, en esta etapa las relaciones de amigos y familiar se rompe, tienen dificultades académicas, laborales, en este periodo hay compromiso orgánico, conductas de riesgo como: promiscuidad sexual, uso de drogas intravenosas o combinación de varias drogas, este último es el que se consideró para este estudio". (Casa., 2019.)

### **3.2. Adolescencia:**

#### **3.2.1. Generalidades:**

“Es “una fase donde todo individuo consolida su autonomía e independencia Psicosocial”; se deduce entonces que la interacción social con sus pares juega un papel fundamental en la formación de su personalidad y conducta, aspectos de los que depende su formación integral”. (Andres Gabriel Cardenas Moreno, 2018).

#### **3.2.2. Definición:**

“La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la adultez que es abordada por todos los seres humanos, independientemente del sexo, origen étnico o ubicación geográfica. Al respecto la Organización Mundial de la Salud la define como todo individuo que se encuentre en una edad comprendida entre los 10 a 19 años de edad (OMS, 2015); se deduce entonces que es un periodo donde se producen cambios puberales, biológicos, psicológicos y sociales que pueden generar situaciones de estrés, conflictos y contradicciones con su entorno”. (Andres Gabriel Cardenas Moreno, 2018).

- Etapas de la adolescencia:
- Hombre:

#### **3.2.3. Pre- adolescencia:**

“Etapa que se encuentran los individuos cuya edad oscile entre los 8 a 11 años de edad, evidenciándose un crecimiento físico y el comienzo de la pubertad, es decir, estar maduro sexualmente. En este periodo se hace notorio el aumento de su capacidad crítica reflexiva sobre lo que ve y hace en determinado contexto, sin consolidar aun sus comportamientos o conductas, por cuanto aún hay cierta dependencia a los padres”. (Andres Gabriel Cardenas Moreno, 2018).

#### **3.2.4. Adolescencia temprana:**

“Se presenta entre los 10 a 13 años de edad, empieza con los cambios físicos, generando preocupación acerca de su proceso de maduración. Tiene que hacer frente a los cambios propios de la pubertad, debiendo adecuarse a las “presiones” sexuales por la elevación de sus hormonas sexuales”. (Naola., 2019).

#### **3.2.5. Adolescencia media:**

“La adolescencia media fluctúa desde los 14 hasta los 16 años de edad, en esta etapa se evidencia un acelerado desarrollo cognitivo, pues se da cabida a pensamientos

operacionales formales. Van dejando de lado lo concreto para dar lugar a lo abstracto llegando a objetar apreciaciones de las personas adultas. El individuo entonces se acopla al mundo egocéntrico del adolescente temprano, al mundo socio-céntrico del adolescente medio y tardío y comienza a modular su conducta impulsiva”. (Naola., 2019).

### **3.2.6. Adolescencia tardía:**

“La adolescencia tardía fluctúa desde los 17 hasta los 19 años de edad, es la etapa donde se afianza su personalidad con relaciones íntimas y una función en la sociedad. En este periodo se ve la vida desde un enfoque socio-céntrico, característica de la adultez. El adolescente tardío puede ser altruista, y los conflictos con la familia y la sociedad se centran en temas de índole moral más que en situaciones egocéntricas”. ”. (Naola., 2019).

“Se muestran tolerantes al ambiente cultural de su entorno, así como también el accionar de lo que representa para ellos un modelo en la casa, en el colegio y a través de los medios de comunicación”. (Naola., 2019).

- Mujer.

### **3.2.7. Pre- adolescencia:**

“Etapa que se encuentran los individuos cuya edad oscile entre los 8 a 11 años de edad, evidenciándose un crecimiento físico y el comienzo de la pubertad, es decir, estar maduro sexualmente. En este periodo se hace notorio el aumento de su capacidad crítica reflexiva sobre lo que ve y hace en determinado contexto, sin consolidar aun sus comportamientos o conductas, por cuanto aún hay cierta dependencia a los padres”. (Andres Gabriel Cardenas Moreno, 2018).

### **3.2.8. Adolescencia temprana:**

“Se presenta entre los 10 a 13 años de edad, empieza con los cambios físicos, generando preocupación acerca de su proceso de maduración. Tiene que hacer frente a los cambios propios de la pubertad, debiendo adecuarse a las “presiones” sexuales por la elevación de sus hormonas sexuales”. (Naola., 2019).

### **3.2.9. Adolescencia media:**

“La adolescencia media fluctúa desde los 14 hasta los 16 años de edad, en esta etapa se evidencia un acelerado desarrollo cognitivo, pues se da cabida a pensamientos operacionales formales. Van dejando de lado lo concreto para dar lugar a lo abstracto llegando a objetar apreciaciones de las personas adultas. El individuo entonces se acopla

al mundo egocéntrico del adolescente temprano, al mundo socio-céntrico del adolescente medio y tardío y comienza a modular su conducta impulsiva”. (Naola., 2019).

### **3.3. Adolescencia tardía:**

“La adolescencia tardía fluctúa desde los 17 hasta los 19 años de edad, es la etapa donde se afianza su personalidad con relaciones íntimas y una función en la sociedad. En este periodo se ve la vida desde un enfoque socio-céntrico, característica de la adultez. El adolescente tardío puede ser altruista, y los conflictos con la familia y la sociedad se centran en temas de índole moral más que en situaciones egocéntricas”. ”. (Naola., 2019).

“Se muestran tolerantes al ambiente cultural de su entorno, así como también el accionar de lo que representa para ellos un modelo en la casa, en el colegio y a través de los medios de comunicación”. (Naola., 2019).

### **3.4. Cambios de la adolescencia:**

#### **3.4.1. Cambios físicos:**

Los adolescentes desarrollan mayor control sobre los impulsos ante determinados estímulos.

- Mujer: En las mujeres ensanchamiento de caderas, aparición de acné, crecimiento de las mamas, desarrollo y maduración de los órganos sexuales, desarrollo de las glándulas mamarias entre otros.
- Hombre: Presentan cambios físicos como: ensanchamiento de la voz, aparición del vello corporal, músculos más desarrollados, aumento de los testículos, maduración de los órganos genitales, crecimiento del vello en las axilas y pubis, etc.

#### **3.4.2. Cambios en la personalidad:**

“El adolescente tiene la capacidad para comprender realidades abstractas que configuran su esquema cognitivo y le permiten desenvolverse de mejor manera en determinado contexto. Su pensamiento crítico y la capacidad reflexiva es notoria en su accionar, permitiéndole interpretar de mejor manera problemas complejos que tienen relación su diario accionar”. (Andres Gabriel Cardenas Moreno, 2018).

- Mujer.
- Hombre.

### **3.4.3. Cambios emocionales:**

“El adolescente refleja cambios de humor repentinos difiriendo del estado de ánimo y estímulos que pudiese recibir, lo cual hace que busquen aislarse de los demás miembros de su familia, desarrollando de paso un apego social con su pares o amigos. Se vuelve más desafiante, polémico, contradictorio y siempre quiere que las cosas sean como el que cree que deberían ser, lo cual puede llevarlo a tomar decisiones nada beneficiosas para su bienestar”. (Andres Gabriel Cardenas Moreno, 2018).

- Mujer.
- Hombre.

### **3.4.4. Desarrollo social:**

“El adolescente muestra más confianza en sus amigos en temas como la sexualidad o relaciones afectivas, se emancipa de su familia y establece lazos más estrechos con sus amigos”. (Andres Gabriel Cardenas Moreno, 2018).

- Mujer.
- Hombre.

## **3.5. Factores de riesgo de las drogas en adolescentes**

### **3.5.1. Factores de riesgo individuales:**

Estos incluyen todas las características propias de cada persona, mismas que lo conforman como un ser único entre las cuales se encuentran; las actitudes, creencias, conductas, ideas, forma de ser y expectativas, las cuales tienen la capacidad de fomentar o alejar el consumo de sustancias ilegales, se destacan las siguientes:

- ⇒ La edad: “El paso de los años en los individuos tiene efectos negativos en la probabilidad de consumo, intensidad y frecuencia del mismo, la etapa donde se registra el mayor aumento de utilización de drogas es entre los 13 y 15 años, después de los 24 años el consumo desciende considerablemente”. (Ramirez., 2020)
- ⇒ El sexo: “Históricamente los reportes estadísticos mundiales han mostrado que los hombres mantienen un consumo superior al de las mujeres, sin embargo, esta tendencia se ha modificado en los últimos años hacia la homogenización”. (Ramirez., 2020)
- ⇒ Los valores y creencias. “Se refieren a las cualidades socialmente positivas que permiten que los individuos logren o concreten sus metas, comúnmente impuestas o determinadas de manera cultural, se ha demostrado que pueden predecir conductas de consumo ya que los jóvenes desde su perspectiva analizan el consumo o ausencia del mismo, algunos ejemplos son: (1) la

religiosidad, (2) el grado de satisfacción personal respecto a la vida y las (3) actitudes positivas hacia la salud". (Ramirez., 2020)

- ⇒ La agresividad: "Predisposición para actuar de manera violenta o agresiva ante las diferentes situaciones sociales fuera de control, algunos estudios indican que este factor de riesgo es reconocible desde las primeras etapas del infante". (Ramirez., 2020)
- ⇒ La búsqueda de sensaciones: "Actitud constante a buscar estímulos que resulten placenteros o novedosos, tiene la finalidad de conocer los propios límites y características". (Ramirez., 2020)
- ⇒ Actitudes hacia las drogas: "Incluye las creencias, pensamientos, ideas, reflexiones, intenciones, expectativas sobre las drogas sus efectos y consecuencias, ante su consumo". (Ramirez., 2020)
- ⇒ Recursos sociales: "Son las capacidades que tiene el individuo para relacionarse de acuerdo con la realidad de manera adecuada, expresar sus emociones y dar respuestas a situaciones negativas, la falta de habilidades sociales se compensa con el uso de alguna sustancia eliminando sentimientos de ansiedad". (Ramirez., 2020)
- ⇒ Autocontrol: "La capacidad del individuo para dirigir sus propias conductas, emociones o pensamientos, evitando estímulos o situaciones que puedan causar conflictos, por lo que a menor capacidad de autocontrol aumenta la cantidad de consumo". (Ramirez., 2020)
- ⇒ Otros problemas de conducta: "Estos son factores que aumentan el riesgo para el consumo en los adolescentes la hiperactividad, rebeldía, pobre autocontrol, dificultad para relacionarse, la alienación, la conducta antisocial". (Ramirez., 2020)

### **3.5.2. Factores de riesgo racionales:**

Estos hacen referencia a los aspectos, situaciones, o relaciones personales establecidas con personas o grupos cercanos, los cuales influyen de manera directa, como la familia, los amigos y el contexto escolar.

- ⇒ La familia: "Es el principal contexto donde las personas toman experiencias, se desarrollan, adquieren valores, creencias además de controlar o filtrar los estímulos sociales externos como la escuela o amistades por un gran periodo de tiempo, por lo que su influencia para el consumo de drogas es significativa". (Ramirez., 2020).
- ⇒ Apoyo a los hijos: "En las actividades, pensamientos o actitudes de manera supervisada, disminuyen la posibilidad del consumo. Además, un ambiente familiar cohesionado, con buena comunicación, que permita que todos los miembros expresen sus sentimientos e interactúen con otros sistemas representan los principales factores protectores ante el consumo". (Ramirez., 2020).

- ⇒ Figura paterna: “Es muy significativa para el adolescente otorgando una influencia protectora contra el uso de drogas ilícitas o la aparición de algunos trastornos psicológicos, como la depresión y la ansiedad”. (Ramirez., 2020).
- ⇒ Las relaciones afectivas entre padres e hijos: “Cuando el adolescente tiene una imagen, sentimientos, emociones o ideas hostiles sobre su familia en especial hacia las figuras de autoridad se incrementa la probabilidad de consumo, observándose la sustancia como un escape a la realidad familiar”. (Ramirez., 2020).
- ⇒ Historia de abuso de sustancias: “No existen estudios contundentes que determinen si existe predisposición genética a desarrollar abuso de sustancias, sin embargo, es posible que se reproduzca la conducta como una consecuencia del modelado o aprendizaje vicario del infante”. (Ramirez., 2020).
- ⇒ Pautas educativas familiares: “Las normas dentro de la familia como, déficit o exceso disciplinario, la excesiva implicación de uno de los padres acampada del desentendimiento de otro, baja comunicación, límites poco claros y bajas expectativas académicas son predictores importantes para el consumo”. (Ramirez., 2020).

### 3.5.3. Factores de riesgo sociales:

Hacen referencia a un entorno social más amplio. La estructura económica, normativa, la accesibilidad al consumo, la aceptación social del mismo y las costumbres y tradiciones imprimen unas características que diferencian a unas culturas de otras y por tanto afectan a la conducta del individuo.

- ⇒ Accesibilidad a las drogas: “La fácil disponibilidad de un consumidor potencial para conseguir alguna droga legal o ilegal, es un factor de alto riesgo en el inicio y mantenimiento del consumo”. (Ramirez., 2020).
- ⇒ La depravación social: “El individuo que comparte su vida diaria con una comunidad que presenta niveles muy bajos de adquisición económica, situaciones sociales relacionadas con la delincuencia y pocas expectativas de mejora presenta un mayor riesgo para el consumo de drogas”. (Ramirez., 2020).
- ⇒ La desorganización comunitaria: “Comunidades donde no son aprovechados para el bien común el recurso propio aunado a relaciones débiles o distantes entre los miembros sin la presencia de un líder, genera en los infantes lazos débiles con figuras de autoridad o el seguimiento de normas”. (Ramirez., 2020).
- ⇒ La movilidad de la población: “Cuando una persona decide o tiene la necesidad de modificar su residencia en busca de mejores condiciones de vida, escuela o situaciones de riesgo se encuentra en vulnerabilidad por la falta de redes de apoyo”. (Ramirez., 2020).

**Marco normativo.**

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones:

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones.

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones.

Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana, se entiende por:

1. Adicción o dependencia, es el estado psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga, caracterizado por modificación del comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar dicha sustancia en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación.
2. Adicto o farmacodependiente, es la persona con dependencia a una o más sustancias psicoactivas.
3. Adolescente, son las personas que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.
4. Alcoholismo, es el síndrome de dependencia o adicción al alcohol etílico.
5. Consejo de salud, es una intervención breve que puede ser aislada o sistemática, cuyo objetivo es que el paciente o usuario de servicios de salud adopte un cambio voluntario en su conducta con un impacto positivo en la salud.
6. Consumo de sustancias psicoactivas, es el rubro genérico que agrupa diversos patrones de uso y abuso de estas sustancias, ya sean medicamentos o tóxicos naturales, químicos o sintéticos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central.
7. Consumo perjudicial, es el uso nocivo o abuso de sustancias psicoactivas, el patrón desadaptativo de consumo, manifestado por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el consumo repetido de alguna o varias sustancias.
8. Delirium, es el estado mental agudo, reversible, caracterizado por confusión y conciencia alterada, y posiblemente fluctuante, debido a una alteración de metabolismo cerebral.
9. Droga, se refiere a cualquier sustancia que previene o cura alguna enfermedad o aumenta el bienestar físico o mental. En farmacología se refiere a cualquier agente químico que altera la bioquímica o algún proceso fisiológico de algún tejido u organismo.

**Población.**

La población con la cual realizare mi investigación es un conjunto de personas que estudian en la universidad del sureste campus Comitán, la cual es una universidad privada que cuenta con una amplia área de carreras profesionales de ámbito con la salud como: medicina, enfermería, veterinaria, psicología, nutrición, etc.

La carrera de medicina humana consta de un periodo de 4 años en la universidad, 1 año donde se realizaran prácticas y otro año de servicio social, dando como resultado 6 años en total para poder ser considerado médico. Los estudiantes se encuentran en rangos de edad de 18 a 25 años, por lo tanto deduzco que casi todos han probado algún tipo de droga y esto puede ser por la tensión que sufren por su carrera, como sabemos la carrera de medicina es difícil (al igual que otras carreras), pero esta carrera tiene una amplia demanda ya que se requieren conocer diversos temas, por lo que los estudiantes de medicina viven en un constante estrés.

**Muestra.**

Se excluirá a todos los aspectos inclusivos y exclusivos de la población

Se incluirá a todos los estudiantes que cursen la carrera de medicina humana, en campus UDS Comitán la cual es una escuela privada que cuenta con una amplia área de carreras profesionales no solo carreras con el ámbito de la salud, sino que actualmente la universidad cuenta con 24 licenciaturas, 6 maestrías y 2 doctorados.

Se incluirán a todos los que se encuentren en cualquier semestre (Desde Primero a octavo semestre).

Se excluirá a todos los estudiantes de otras carreras, estén o no relacionados con el ámbito de la salud, únicamente trabajaremos con los estudiantes de medicina humana.

### **Técnicas e instrumentos de recolección de datos.**

La recolección de datos es un proceso de recopilación cuyo objetivo es obtener información para establecer conclusiones sobre un tema determinado.

Para mi investigación y dadas las circunstancias (pandemia por COVID-19) empleare 3 técnicas para la recolección de datos:

- La primera técnica consta de observación directa la cual me ayudara a poder analizar e interpretar el problema de mayor relevancia.
- La segunda técnica será mediante una encuesta que se creará en una página de la plataforma de Facebook, contará con todos los niveles de privacidad para no presentar inconvenientes. Esta técnica será empleada de apoyo para la recopilación de información sobre el consumo de drogas y los efectos que este ocasiona en los estudiantes.
- La tercera técnica será con ayuda de la aplicación de WhatsApp, esta es una herramienta relevante y puede ser empleada para una apta recolección de datos se utilizará como última opción para aquellos que no puedan acceder a plataformas ya mencionadas o por mayor accesibilidad.
- Y por último, la tercera técnica será una entrevista estructurada la cual será realizada por la plataforma de zoom con la finalidad de tener más información certera.

## Cronograma.

**Bibliografías:**

Lorenia; R. (2020). Estrategias empleadas dentro de una comunidad para el consumo problemático de drogas en mujeres adolescentes. Recuperado de [1\\_Estrategias empleadas dentro de una comunidad teoterapéutica pentecostal para el consumo problemático de drogas en mujeres adolescentes.pdf](#)

Lili; M. (2019). Relacion entre la comunicación familiar y el riesgo de embarazo adolescente en estudiantes. Recuperado de [2\\_Relación entre la comunicación familiar y el riesgo de embarazo adolescente en estudiantes.pdf](#)

Sheila; C. (2020). Correlación entre conductas de riesgo y nivel socioeconómico en adolescentes de educación media superior. Recuperado de [3\\_Correlación entre conductas de riesgo y nivel socioeconómico en adolescentes de educación media superior..pdf](#)

Isabel; S. (2020). Factores relacionados con la resiliencia de adolescentes en contextos de vulnerabilidad social; revisión integradora. Recuperado de [4\\_Factores relacionados con la resiliencia de adolescentes en contextos de vulnerabilidad social revisión integradora.pdf](#)

David; A. (2020). Consecuencias del consumo de drogas en las funciones ejecutivas en adolescentes y jóvenes adultos. Recuperado de [5\\_Consecuencias del consumo de drogas en las funciones ejecutivas en adolescentes y jóvenes adultos.pdf](#)

Karen; S. (2020). Estudio de caso: factores psicológicos que motiva al adolescente a recaer en el consumo de drogas. Recuperado de [6\\_Estudio de caso factores psicológicos que motiva al adolescente a recaer en el consumo de drogas.pdf](#)

Milena; A. (2020). Complicaciones del consumo de drogas ilícitas en adolescentes gestantes. Recuperado de [7\\_Complicaciones del consumo de drogas ilícitas en adolescentes gestantes.pdf](#)

Rosa; C. (2020). Política social comunitaria para afrontar el consumo de drogas en adolescentes. Recuperado de [8 Política social comunitaria para el consumo de drogas en adolescentes.pdf](#)

Marcos; F. (2020). Consumo de drogas en la adolescencia. Recuperado de [9 Consumo de drogas en la adolescencia.pdf](#)

Andrés; A. (2020). Reflexiones del consumo de drogas en clave de género, epidemiología y marketing nocivo. Una construcción de la conexión y la nueva ética occidental. Recuperado de [10 Reflexiones del consumo de drogas en clave de género, epidemiología y marketing nocivo.pdf](#)

Martha; B. (2020). Drogadicción en la juventud estudiantil una epidemia en la actualidad. Recuperado de [11 Drogadicción en la juventud estudiantil una epidemia actual.pdf](#)

Tunki; K. (2019). Causas y consecuencias de la drogadicción en el rendimiento académico de los estudiantes de la unidad educativa del milenio guardiana de la lengua bosco wisuma. Recuperado de [12 Causas y consecuencias de la drogadicción en el rendimiento académico de los estudiantes.pdf](#)

Carlos; H. (2019). Predictores de la intención de consumo de marihuana en adolescentes. Recuperado de [13 Predictores de la intención de consumo de marihuana en adolescentes.pdf](#)

Maria; A. (2019). Factores de riesgo y etapas de adquisición del consumo de drogas ilícitas en estudios mexicanos. Recuperado de [14 Factores de riesgo y etapas de adquisición del consumo de drogas ilícitas en estudiantes mexicanos.pdf](#)

Catalina; G. (2019). Los problemas psicosociales y el suicidio en jóvenes. Estado actual y perspectiva. Recuperado de [15 Los problemas psicosociales y el suicidio en jóvenes. Estado actual y perspectivas.pdf](#)

Junfanlee; O. (2020). Drogas en la adolescencia investigación (auto) biográfica como dispositivos de reflexión crítica en escuelas. Recuperado de [16 Drogas en la adolescencia investigación auto biográfica como dispositivo de reflexión crítica.pdf](#)

Argoti; C. (2020). Estrategias de afrontamiento en adolescentes con consumo problemático que se encuentran internos en un centro de orientación juvenil. Recuperado de [17 Estrategias de afrontamiento en adolescentes con consumo problemático que se encuentran internos en un centro de orientación juvenil.pdf](#)

Angie; M. (2019). Factores de riesgo y protección asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Recuperado de [18 Factores de riesgo y protección asociados al consumo de sustancias psicoactivas en una muestra de adolescentes.pdf](#)

Hilwi; L. (2020). Autodeterminación como factor de inhibición al consumo de drogas ilícitas en adolescentes con situaciones de riesgo. Recuperado de [19 Autodeterminación como factor de inhibición al consumo de drogas ilícitas en adolescentes con sustancias de riesgo.pdf](#)

Daniel; M. (2019). “Creación de espacios de fortalecimiento de habilidades para la vida que prevengan el consumo de drogas en la adolescencia”. Recuperado de [20 Creación de espacios de fortalecimiento de habilidades para la vida que provengan el consumo de drogas en la adolescencia.pdf](#)

Ignacio; A. (2019). Programas de intervención en adolescentes de centros escolares sobre el consumo de drogas. Recuperado de [21 Programa de intervención en adolescentes de centros escolares sobre el consumo de drogas.pdf](#)

Erazo; S. (2020). Inicio del consumo de drogas en adolescentes. Recuperado de [22 Inicio del consumo de drogas en adolescentes.pdf](#)

Virginia; M. (2016). Rasgos de personalidad predictores del consumo de drogas en adolescentes. Recuperado de [23 Riesgos de personalidad predictores del consumo de drogas en adolescentes.pdf](#)

Karina; R. (2020). Programa de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Recuperado de [24 Programa de prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas experiencia de caso de estudiantes..pdf](#)

Blanca; T. (2019). Funcionalidad familiar y deserción escolar en adolescentes con adicción a drogas licitas e ilícitas. Recuperado de [25 Funcionalidad familiar y deserción escolar en adolescentes con adicción a drogas ilícitas.pdf](#)

José; P. (2020). Sintomatología interiorizada y exteriorizada y su relación con comportamientos de suicidio en adolescentes. Recuperado de [26 Sintomatología interiorizada y exteriorizada y su relación con comportamientos de suicidio en adolescentes.pdf](#)

Thalía; P. (2020). El consumo de sustancias psicoactivas y su influencia en el desarrollo integral. Recuperado de [27 Consumo de sustancias psicoactivas y su influencia en el desarrollo integral.pdf](#)

Hidalgo; V. (2007). Adolescencia de alto riesgo consumo de drogas y conductas delictivas. Recuperado de [28 Adolescencia de alto riesgo consumo de drogas y conductas delictivas.pdf](#)

Ruth; M. (2020). Patrones de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios. Recuperado de [29 Patrones de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios.pdf](#)

Julia; R. (2020). Alergia de drogas de abuso en niños y adolescentes. Recuperado de [30 Alergia de drogas de abuso en niños y adolescentes.pdf](#)

Ingrid; F. (2020). Educación deportiva integral: una propuesta para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Recuperado de [31 Educación deportiva integral una propuesta para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.pdf](#)

Javier; G. (2020). Prevención y abordaje del consumo de drogas en adolescentes. Recuperado de [32 Prevención y abordaje del consumo de drogas en adolescentes intervención motivacional breve en contextos educativos.pdf](#)

Maria; S. (2020). Relacion entre consumo de sustancias y rasgos esquizotípicos en adolescentes. Recuperado de [33 Relación entre consumo de sustancias y rasgos esquizotípicos en adolescentes escolarizados.pdf](#)

Alfger; K. (2020). Principales directrices y desarrollo del modelo Islandés para la prevención del uso de sustancias en adolescentes. Recuperado de [34 Principios directrices y desarrollo del modelo Islandés para la prevención del uso de sustancias en adolescentes.pdf](#)

Fabio; B. (2020). Consumo de drogas en estudiantes de centros escolares. Recuperado de [35 Consumo de drogas en estudiantes de centros escolares.pdf](#)

Andrés; C. (2018). Factores de riesgo en el consumo de drogas licitas e ilícitas en los adolescentes. Recuperado de [36 Factores de riesgo en el consumo de drogas licitas e ilícitas en los adolescentes.pdf](#)

Flavio; R. (2001). Percepción a cerca del consumo de drogas en estudiantes de una universidad nacional. Recuperado de [37 Percepción a cerca del consumo de drogas en estudiantes de una universidad nacional.pdf](#)

## Apéndice


### CROQUIS:

Lugar y ubicación en donde se realizara la investigación: UNIVERSIDAD DEL SURESTE, CAMPUS COMITAN.




<b>CUESTIONARIO:</b>			
<p><b>Nosotros somos alumnos del cuarto semestre grupo A “Medicina Humana”, el siguiente cuestionario servirá para la elaboración de un protocolo, te pedimos que subrayes tu respuesta y respondas de la forma más sincera y seria posible.</b></p>			
Sexo			
Masculino		Femenino	
Edad:			
18 a 20 años		20 a 25 años	
Más de 25 años			
¿Sabes qué es el resfriado común?			
Si		No	
¿Te has enfermado del resfriado común?			
Si		No	
¿Cuántas veces te has enfermado este año 2025?			
1 a 2		3 a 4	
5 a 6		Más de 6 veces	
¿En qué estación del año te enfermaste con mayor frecuencia?			
Primavera		Invierno	
Verano		Otoño	
¿Por cuánto tiempo tienes resfriado común?			
1 a 3 días		4 a 7 días	
Más de 7 días		Un mes	
¿Utilizas cubrebocas cuando te enfermas?			
Si		No	
¿Qué tipo de cubrebocas utilizas?			
KN95		sencillo	
de tela reutilizable		no utilizo	
¿Te automedicas cuando te enfermas?			
Si		No	
¿Qué tomas cuando te enfermas?			
Paracetamol		Antibióticos	
Té de hierbas		Nada	
¿Cuál es el signo o síntoma más frecuente cuando te enfermas?			
Rinorrea		mialgia	
artralgia		tos	
¿Con que intensidad tienes los signos y síntomas?			
Alta		Mediana	
Baja			
¿Te cubres al estornudar?			

Si	No
¿Usas gel anti-bacterial cuando te enfermas?	
Si	No

**Tabuladores de datos obtenidos:**


En esta gráfica observamos que la mayoría de los encuestados fueron hombres siendo que algunas mujeres no quisieron participar en la encuesta y en los grupos que encuestamos la mayoría era hombre




En esta gráfica observamos que el 64 % de las personas que encontramos fueron del grupo de edad de 18 y 20 años, el 32% fueron mayores de los 20 años de los que teníamos previstos




En la gráfica observamos sobre el total de personas encuestadas el 98% conoce sobre la patología del resfriado común, era de esperarse ya que son estudiantes de medicina de cuarto semestre de medicina humana.



En esta gráfica observamos que absolutamente todos se han enfermado de refriado común en este período que va del presente año, ausencia de los que no, nos propone que el sistema inmune de los estudiantes de medicina humana del cuarto semestre de la UDS es bajo.




En esta gráfica observamos a los alumnos de medicina humana la frecuencia en la cual se enfermaron en el año 2025 es el 89% (39 personas) se enfermaron de 1 a 2 veces en el transcurso de este 2025




En esta gráfica observamos que el 89% (40) de personas que se han enfermado en el período de invierno el pico más bajo fue en verano, pues fueron solo dos personas que respondieron




En esta gráfica observamos la duración del resfriado común en los estudiantes de medicina la mayor parte de personas se enfermaron de 4 a 7 días en el 57% (25 personas) a comparación con las personas que les dura un mes solo es el 2% ( 1 persona)




En esta gráfica representa el uso del cubre boca en algunas personas que se encuentran enfermas sin embargo, solo una cuarta parte que representa el 23% no usa cubrebocas cuando se encuentra enfermo




En esta gráfica observamos los tipos de cubrebocas utilizados con mayor frecuencia el 68% (29 personas) que utilizan cubrebocas sencillo que tiene una protección media a comparación con el KN95 que son más de protección mas alta en 28% (12 personas)




En esta gráfica observamos las personas que se automedican en el resfriado común que el 55% (24 personas si se automedican) y el 45% (20 personas no se automedican)




En esta gráfica observamos que la mayoría de los encuestados usan paracetamol para aliviar sus síntomas del resfriado común, mientras que los demás utilizan té, antibióticos y nada




En esta gráfica observamos que la mayoría de los encuestados tiene rincorrea y que la tos es la que le sigue en cada una de ellas, como últimas opciones tenemos a la fiebre y las mialgias y artralgias de cada uno de los encuestados



En esta gráfica observamos y nos da a entender que la mayoría de las personas no presentan un cuadro sintomático tan alto debido a las incomodidades que esta presenta, algunas que puede ser por el estado inmunológico bajo incrementa a un nivel alto que representa el 7%



En esta gráfica nos da a entender que la mayoría tiene una buena educación al tratar de taparse y evitar la propagación del virus en otras personas, solo un porcentaje bajo que representa a tan solo 3 personas que no se cubren a la hora de estornudar



En esta gráfica observamos que la mayoría de personas utilizan gel antibacterial en la cual es el 80% (35 personas) y el 20% (9 personas) no utiliza gen antibacterial un problema para la prevención del resfriado común

### Conclusión 1: Hipótesis, objetivos y problemática

La hipótesis plantea que existe una alta prevalencia del resfriado común entre los estudiantes de medicina del cuarto semestre. Esta se sostiene al comprobarse que el 100% de los encuestados ha enfermado al menos una vez en el periodo estudiado. Los objetivos se cumplieron eficazmente, permitiendo identificar las causas, frecuencia y conductas asociadas con la enfermedad. La problemática reside en la falta de medidas preventivas eficaces y el frecuente uso inadecuado de medicamentos, como antibióticos sin indicación médica, lo que pone en evidencia una oportunidad para mejorar la educación sanitaria incluso entre estudiantes del área de la salud.

### Conclusión 2: Análisis de gráficas y observaciones

Las gráficas revelan patrones importantes: la estación con más casos fue el invierno, con una duración media de 4 a 7 días. El uso del cubrebocas es frecuente, aunque no universal, y predominan los modelos sencillos con menor protección. Es significativo que un 55% se automedique, lo cual puede tener implicaciones negativas a largo plazo. Se observa un uso racional del paracetamol, pero también la automedicación con antibióticos y remedios caseros. La mayoría conoce los síntomas más frecuentes como rinorrea y tos, y emplea medidas preventivas básicas como el uso de gel antibacterial. Estas tendencias ofrecen un panorama general sobre los hábitos de salud respiratoria entre jóvenes universitarios.

### Conclusión 3: General del trabajo

Este estudio aporta datos relevantes sobre la prevalencia del resfriado común entre estudiantes universitarios. A pesar del nivel educativo en el área de la salud, persisten conductas de riesgo como la automedicación y el uso incorrecto de cubrebocas. La implementación de campañas educativas enfocadas en la prevención y el manejo adecuado del resfriado común podría reducir significativamente su incidencia. Asimismo, se recomienda fomentar un entorno de salud preventiva dentro del campus universitario. La investigación destaca la importancia de reforzar el conocimiento aplicado en la práctica cotidiana, incluso entre futuros profesionales de la salud.

### **PRESUPUESTO:**

Numero	Concepto	Precio unitario	Número de unidades	Total

<b>1</b>	Luz	\$250 mensual	4 meses	\$1000
<b>2</b>	Internet	\$350 mensual.	4 meses	\$1400
<b>3</b>	Tablet	\$7000	1	\$7000
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$9400</b>

<b>Numero</b>	<b>Cargo:</b>	<b>No. De personas:</b>	<b>Sueldo:</b>	<b>Total de horas:</b>	<b>Costo total:</b>
<b>1</b>	Medico.	1	300	3	\$900
<b>1</b>	Psicólogo/a	1	200	3	\$600
<b>TOTAL:</b>		2	500	6	\$3000

**Vita:**

El autor Williams Said Pérez García nació en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas el 11 de diciembre de 2005. Concluyó sus estudios de educación básica en la escuela secundaria Amado Nervo del estado Comitán, en donde obtuvo buenas calificaciones. Después concluyó satisfactoriamente sus estudios de nivel medio superior en el centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios no. 108 (CBTis 108) en donde se graduó como técnico de laboratorista clínico y actualmente se encuentra cursando el 4<sup>to</sup> semestre de la carrera de medicina humana del campus UDS Comitán, Chiapas.

El autor Jonathan Omar Galdámez Altamirano que nació en Comitán de Domínguez Chiapas el día 12 de junio del 2005. Terminó sus estudios en la escuela secundaria técnica número 5, donde salió con el taller de informática. Posteriormente concluyó en el centro de bachillerato tecnológico, industrial y de servicios número 108, donde se graduó con doble perfil, laboratorista clínico y de recursos humanos. Actualmente se encuentra trascendiendo en la universidad del sureste campus Comitán, en la facultad de Medicina humana.