

TIPOS DE FACIES

ALUMNO:

Brayan Henry Morales López

GRADO: Cuarto Semestre

GRUPO: A

DOCENTE: Dra. Karla Sofía Lopez

Comitán de Domínguez Chiapas; a 28 de Febrero del 2025.



Mi Universidad



Facie Renal:

- Edema de cara con localización palpebral
- palidez de los tegumentos
livedez en los labios
- movimientos lentos y que no cede el dolor
- Coloración amarillenta



Facies caquéctica:

- Aparece en la desnutrición extrema.
- La disminución del panículo adiposo hace resaltar los relieves óseos (arco cigomático, orbitas, regiones temporales).
- Los rasgos se afilan.




Facie Lupica:

- Erupción eritemato-papulo-escamoso en las mejillas ,nariz.
- Como asa de mariposa




Facie Cianótica:

- coloración azulada de las partes salientes, en especial de las mejillas, nariz, mentón, lóbulos de las orejas y labios



facies de Mongoloide

- Inclínación mongoloide de los ojos
- pliegues epicánticos
- puente nasal aplanado
- implantación baja de las orejas y macroglosia



facies de Acromegálica

- Agrandamiento del cartílago de la nariz
- prognatismo del maxilar inferior
- Agrandamiento de los senos paranasales.
- La lengua es grande, y los arcos superciliares y cigomáticos son prominentes.




facie de Hipertiroidismo

- (cara de asustada)
- exoftalmos
- retracción palpebral.
- (Signo de la retracción palpebral).
- Tiene escaso parpadeo, mirada fija o "dura" y brillante



facies Anémica:

- Perdida del color rosado normal
- Palidez generalizada que compromete labios




Facies Leonina:

- A semeja la cara de un leon
- Engrosamiento de la piel de la frente, mejillas, pabellones, auriculares y menton
- Nariz hundida y Enanchada




Facies parkinsoniana.

- Inexpresión de la cara, fijeza de la mirada
- falta de parpadeo
- supresión de la mímica
- aspecto grasoso de la cara
- cara de pomada
- boca entreabierta con sialorrea.



facies Síndrome de Cushing

- Acumulación de grasa en la región bitemporal (facies lunar)
- Entre los omóplatos y detrás del cuello (joroba de búfalo),
- Región supraclavicular (produciendo un "collar" alrededor de la base del cuello), y en frente del esternón



Facies del Síndrome de Horner:

- Ptosis palpebral
- Miosis
- Anhidrosis
- Enoftalmos aparente

