



**Mi Universidad**

**Facies**

*Ramón de Jesús Aniceto Mondragón*

*Parcial I*

*Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico*

*Dra. Karla Sofía López Gutiérrez*

*Medicina Humana*

*Cuarto Semestre*

*Comitán de Domínguez, Chiapas a 28 de febrero de 2025*



# TIPOS DE FACIES



## FACIE RENAL



Piel pálida y con edema más acentuado a nivel de párpados. se encuentra en pacientes con insuficiencia renal

## FACIE CAQUETICA



Con palidez y relieves óseos marcados, con cara triste y cansada, con un tinte pardo-grisáceo. Se ve en desnutrición y en neoplasias.

## FACIE LUPICA



Las lesiones cutáneas que asientan en la cara constituyen el eritema en vespertilio o en mariposa cuyo cuerpo asentara en el dorso nasal y las alas se desplegaran en la región malar están constituidas por placas induradas rojas o violáceas planas o ligeramente elevadas de bordes netos y recubiertas de escamas cuyo desprendimiento deja a la vista folículos pilosos.

## FACIE CIANOTICA




La cara toma una coloración violácea especialmente en las zonas más prominentes: lóbulo de la nariz, mentón, lóbulo de la nariz, orejas y labios.

## FACIE PARKINSONIANA



Se caracteriza por inexpresión de la cara, fijeza de la mirada, falta de parpadeo, supresión de la mímica, aspecto grasoso de la cara “cara de pomada” y la boca entreabierta con sialorrea.

## FACIE DE CUSHING




Esta facies se caracteriza por una cara redondeada con plenitud en las mejillas y una distribución de grasa centrada en la parte superior del cuerpo.

## FACIE DE HORNER



Producida por parálisis del simpático cervical, se caracteriza por disminución de la hendidura palpebral –enofthalmos– del lado paralizado, congestión de la conjuntiva y miosis por predominio de la acción del motor ocular común y ptosis palpebral.

## FACIE MONGOLOIDE



Ojos oblicuos, microcefalia, labios grandes, macroglosia, hipertelorismo y epicanto.

## FACIE ACROMEGALICA



Esta facies se caracteriza por una cara agrandada con rasgos gruesos, mandíbula pronunciada y frente prominente.

## FACIE HIPERTIROIDEA



Mirada fija de verdadero terror, rigidez de la expresión, exoftalmos e intensos cambios vasomotores de la piel de la cara.

## FACIE ANÉMICA



Se caracteriza por palidez en la piel y mucosas, ojeras marcadas, labios y encías pálidos, además de un aspecto cansado. En anemias crónicas, puede haber adelgazamiento facial y piel seca.

## FACIE LEONINA



Aspecto de la cara que parece a la de un león. Se produce por lesiones infiltrativas en la piel de la cara y es típica de la lepra lepromatosa.

Hecho por: Ramón de Jesús Aniceto Mondragón