

Universidad del sureste, campus Comitán

FACIES

Anamim Cordero Aranda

Dra. Karla Sofia Lopez Gutierrez

28/02/2025

RENAL

Cara pálida, edematosa, con párpados hinchados y fisonomía abotagada. Se asocia a enfermedades renales como el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal crónica.



Edema periorbitario

Rostro pálido e hinchado

Labios inflamados

CAQUÉCTICA

Aspecto demacrado, con piel adelgazada y pérdida de la grasa facial. Ojos hundidos, prominencia de pómulos y expresión de agotamiento. Se observa en enfermedades crónicas como cáncer, tuberculosis o desnutrición severa.




LÚPICA

Eritema en "alas de mariposa" que afecta mejillas y puente nasal, respetando el surco nasogeniano. Es característica del lupus eritematoso sistémico.




GÁSTRICA (O GÁNDICA)

Cara con piel pálida, adelgazada, con ojeras marcadas y expresión de sufrimiento. Se asocia a patologías gástricas avanzadas, como el cáncer gástrico o úlceras complicadas.




PARKINSONIANA

Expresión facial inexpresiva o "cara de máscara", con disminución del parpadeo, boca entreabierta y sialorrea ocasional. Propia de la enfermedad de Parkinson.



SX DE CUSHING

Cara redonda ("de luna llena"), con rubor facial y acumulación de grasa en mejillas. Se acompaña de otros signos como fragilidad capilar y obesidad troncular.



MONGOLOIDE

Característica del síndrome de Down. Presenta cara redonda, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, puente nasal deprimido, macroglosia y orejas pequeñas.




SX DE HORNER

Presenta ptosis palpebral (caída del párpado superior), miosis (pupila contraída) y anhidrosis (falta de sudoración en un lado de la cara), debido a afectación del simpático cervical.




ACROMEGÁLICA

Rasgos toscos, con prominencia de arcos supraorbitarios, mandíbula aumentada de tamaño (prognatismo), nariz ensanchada y labios gruesos. Se asocia a la acromegalia por exceso de hormona de crecimiento.



HIPERTIROIDEO

Ojos prominentes (exoftalmos), mirada fija, expresión de sorpresa, piel fina y sudorosa. Es característica del hipertiroidismo, especialmente en la enfermedad de Graves-Basedow.



ANÉMICA

Piel y mucosas pálidas, con aspecto cansado, a veces con adelgazamiento y ojeras. Se observa en anemias de diversas etiologías.



LEONINA

Engrosamiento cutáneo con pliegues profundos en la cara, prominencia de pómulos y nariz ancha. Se asocia a la lepra lepromatosa y algunas patologías infiltrativas como la micosis fungoide.

