


FACIES



Alumno:
Berrios Jiménez Daniel de Jesús

Semiología
4° Semestre, Grupo "A"
Dra. Sofía L. Gutiérrez





RENAL

Piel pálida amarillenta pajiza y con edema más acentuado a nivel de párpados. se encuentra en pacientes con insuficiencia renal.



CAQUÉTICA

Hay desaparición del tejido subcutáneo y de la bola adiposa de Bichat, e hipotrofia muscular. La cara sumida y ojerosa, ostenta un tinte pálido grisáceo. Períodos avanzados de las enfermedades consuntivas (CÁNCER)



LÚPICA

Eritema facial "en mariposa" o heliotropo (zona alrededor de las mejillas y la nariz se ve rojiza). Es típica de Lupus eritematoso sistémico.



CIANÓTICA

Coloración azulada más notable en las mejillas, la nariz, los lóbulos de las orejas y los labios. Se presenta cuando la hemoglobina reducida supera los 5 g/dL



PARKINSONEANA

Fisionomía rígida e inexpresiva. La cabeza está inclinada hacia adelante, los músculos del cuello están rígidos y no puede rotar la cabeza. Lesión de los centros extrapiramidales, en ocasiones parece expresar azoramiento o temor



SX CUSHING

La cara es redonda, en luna llena por adiposidad regional, la piel es rojiza y brillante, la hendidura palpebral estrechada, La boca y labios estirados (boca de pez), cuello corto y grueso, con papada submentoniana



MONGOLOIDE

Cara redondeada, con epicanto en el ángulo interno de los ojos, orejas pequeñas, nariz en silla de montar, macroglosia relativa



SX HORNER

Producida por parálisis del simpático cervical, se caracteriza por disminución de la hendidura palpebral o enoftalmos del lado paralizado, congestión de la conjuntiva y miosis por predominio de la acción del motor ocular común y ptosis palpebral.



ACROMEGÁLICA

Crecimiento de los huesos faciales y los senos frontales, nariz gruesa y abultada, labios grandes y turgentes, dientes separados, arcos superciliares prominentes, párpados abotagados, orejas amplificadas y macroglosia




HIPERTIROIDEO

Se observa una retracción de los párpados superiores acompañada a veces de protrusión ocular (ojos saltones y mirada brillante). La piel es fina y húmeda.



ANÉMICA

Consiste en la pérdida del color sonrosado normal. Palidez generalizada que puede comprometer hasta los labios. Para que el cambio se haga evidente, se requiere un descenso significativo de la hemoglobina (menos de 9 a 10 g/dL).



LEONINA

Todos los contornos de la cara se hacen nodulares y engrosados, particularmente la frente, mejillas, barbilla y nariz aplanada y bulbosa, cejas despobladas en su totalidad y en ocasiones existe alopecia en placas