



Mi Universidad

Lesiones primarias

Mireya Pérez Sebastián

Lesiones Primarias

Parcial II

Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico

Dra. López Gutiérrez Karla Sofía

Medicina Humana

Cuarto Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas. 13 de Abril 2025.

LESIONES PRIMARIAS

Las lesiones primarias son aquellas que se desarrollan como resultado directo de un proceso patológico, y por lo tanto son las más caracterizadas.

MACULA:

Definición: una mácula es una lesión primaria de la piel que se caracteriza por ser una mancha plana con un color diferente al de la piel circundante. No altera el relieve ni la textura de la piel, por lo que no se puede palpar. Las máculas pueden variar en color, desde tonos más oscuros debido a un aumento de pigmento (como la melanina) hasta tonos más claros por la disminución o ausencia de pigmento, como ocurre en el vitíligo.

Característica:

- una macula es un área plana circunscrita, con cambios de coloración de la piel, que mide menos de 1 cm diámetro.
- Es una mancha plana en la piel, no se eleva ni se hunde, por lo que no es palpable al tacto.



PARCHE:

Definición: un parche es una mancha plana y no palpable. Un parche es una mácula grande. Dentro de los ejemplos se incluyen pecas, nevos planos, tatuajes, manchas en vino de Oporto (hemangiomas) y los exantemas de las infecciones por rickettsias, rubéola, sarampión (pueden presentar también pápulas y placas) y algunas alergias medicamentosas.

Características:

- Es un área plana circunscrita, con cambio de color de la piel, que mide más de 1 cm de diámetro.
- Modificables el relieve, consistencia o espesor de la piel

Parches (planos, grandes)



Parches eritematosos, bilateralmente simétricos, en la parte central de los carrillos y en las cejas, algunos con escamas grasas sobrepuestas; *dermatitis seborreica*.



Parches completamente despigmentados, confluentes, grandes, en los dorsos de las manos y en la porción distal de los antebrazos; *vitiligo*.



Parches regionales, eritematosos, bilaterales, con escamas periféricas en las caras internas de los muslos a ambos lados, con respeto del escroto; *tiña inguinal*.

PLACA:

Definición: La placa son lesiones primarias, lesiones palpables que mide mayor de 1 cm diámetro, y que están elevadas o deprimidas en comparación con la superficie de la piel. Las placas pueden tener el techo plano o abombado.

Características:

- Es una placa, es una gran elevación de piel más plana, a veces formada por pápulas que se unen.
- caracteriza por ser sólida, elevada y de más de 1 cm de diámetro.
- Son lesiones palpables.
- Puede ser planas o abombadas.
- Puede presentar en cualquier parte del cuerpo; (codos, rodillas, cuero cabelludo, espalda baja).

Placas (abultadas, grandes)



Placas eritematosas o de color rosa brillante, dispersas, bien circunscritas, con cúpula plana, en las superficies extensoras de rodillas y codos, con escamas plateadas suprayacentes; *psoriasis en placas*.



Placas eritematosas bilaterales, liquenificadas (engrosadas por el roce), mal circunscritas en las caras flexoras de las muñecas, las fosas antecubitales y popliteas; *dermatitis atópica*.



Placa solitaria, ovalada, con cúpula superficial plana, eritematosa o de color piel, en el hemiabdomen derecho; *parche que indica pitiriasis rosada*.



NÓDULO:

Definición: Un nódulo es una lesión sólida, elevada, y circunscrita que se puede presentar en la piel. Es un tipo de lesión cutánea que puede ser más grande que una pápula, pero más pequeña que 2 cm.

Características:

- Mide más de 1 cm de diámetro.
- Generalmente se extiende en capas en las profundidades de la piel.
- De forma abultamiento sólido o quística.

Nódulo: más grande y más profundo que una pápula.



Nódulo solitario, pardo-azul, de 1.2 cm, con un signo de hoyuelo positivo y borde hiperpigmentado, en la cara lateral del muslo izquierdo; *dermatofibroma*.



Nódulo solitario, de 4 cm, rosado y pardo, semejante a una cicatriz en la parte central del tórax, en el sitio de un traumatismo previo; *queloide*.

PÚSTULA:

Definición: Una pústula es una lesión elemental de la piel que consiste en una pequeña llaga llena de pus. Se trata de una lesión primaria que puede estar asociada a infecciones bacterianas o inflamaciones. Es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.

Característica:

- Son lesiones sobre elevadas, similar a ampolla, puede tener un aspecto turbio o amarillento.
- Localizadas en zona o diseminadas por todo el cuerpo.
- Son más comunes en la cara, pecho y la espalda.
- Llenas de pus, llagas pequeñas.
- Inflamadas similares a ampollas.

Pústula: pequeña acumulación de neutrófilos o queratina palpable y de aspecto blanco.



Aproximadamente 15-20 pústulas y pápulas acneiformes en las partes bucal y parotídea de los carrillos, bilaterales; *acné vulgar*.

Cerca de 30 pápulas y pústulas eritematosas de 2-5 mm en las regiones frontal, temporal y parietal del cuero cabelludo; *folliculitis bacteriana*.

VESÍCULAS:

Definición: Las vesículas son lesiones primarias de la piel que consisten en pequeñas ampollas llenas de líquido. Son lesiones elevadas, pequeñas, que contienen líquido de aspecto claro.

Característica:

- Pequeño abultamiento circunscrito en la epidermis.
- Contiene líquido transparente o seroso.
- Mide menos de 1 cm de diámetro.
- Se puede romperse fácilmente y liberar líquido sobre la piel.

Vesículas (llenas de líquido, pequeñas)



Diversas vesículas de 2-4 mm y pústulas con una base eritematosa, agrupadas en la cara izquierda del cuello; *herpes simple*.



Vesículas de 2-5 mm, agrupadas sobre una base eritematosa en la parte izquierda del abdomen y el tronco, con distribución en dermatomas que no cruzan la línea media; *herpes zóster* o culebrilla.



Pápulas y vesículas de 2-5 mm, dispersas, con costra de trasudado, algunas en series lineales, en antebrazos, cuello y abdomen; *dermatitis por zumaque venenoso* o *alérgica por contacto con la hiedra venenosa*.

AMPOLLA:

Definición: Una ampolla es una lesión elemental de la piel que consiste en una burbuja llena de líquido que se forma en la capa externa de la piel. También se le conoce como vesícula cutánea.

Características:

- Son de elevación circunscrita de la epidermis.
- Contiene líquido transparente, serosos o sanguinolento.
- Mide más de 1 cm de diámetros.
- Son más comunes en las manos y los pies.



HABÓN:

Definición: Un habón es una lesión cutánea que se caracteriza por una elevación de la piel, de tamaño variable, con bordes definidos y rojos. Lo que es una elevación en la piel que aparecen de forma transitoria, acompañada de enrojecimiento, picor intenso y una textura edematosa.

Características:

- Denominada roncha o urticaria.
- Ronchas y suelen durar menos de 24 horas.
- Puede afectar áreas muy intensas de la piel.
- Acompañado de sensación de quemazón.

39 **habones:** zona de edema en la dermis, localizada, evanescente (aparece y desaparece) en un período de 1-2 días; es la lesión primaria de la urticaria.



EROSIONES:

Definición: Las erosiones son lesiones cutáneas que consisten en una pérdida superficial de la piel, generalmente sin afectar más allá de la epidermis. Son lesiones elementales que curan sin dejar cicatriz. Pérdida del epitelio epidérmico o mucoso.

Características:

- Son áreas abiertas de la piel.
- Suelen ser resultado de un traumatismo, como rascarse intensamente.
- Son lesiones comunes.
- Son desgastes de la piel, en la capa superficial.
- Son lesiones producidas por pérdida circunscrita de epidermis.




ULCERAS:

Definición: Una úlcera es una lesión abierta en la piel o en la membrana mucosa de los órganos internos. Se produce cuando se pierden las capas superiores de la piel o tejido. Es la pérdida más profunda de la epidermis y al menos de la dermis superior.

Características:

- Son lesiones más graves que las fisuras o las erosiones.
- Pueden ser crónicas.
- Son lesiones cutáneas que se producen cuando se pierde la epidermis y parte de la dermis.
- se forman comúnmente donde los huesos están cerca de la piel, como los tobillos, los talones y las caderas.



PETEQUIAS:

Definición: Las petequias son manchas rojas, moradas o marrones que se parecen a la punta de un alfiler. Son lesiones primarias que aparecen cuando los capilares sangran y se derrama sangre en la piel. Son los focos punteados de hemorragias no blanqueables.

Características:

- Son planas y redondas.
- No son elevadas ni pican o comezón.
- No palidecen a la presión.
- Producen sangrado puntos de color rojo, marrón o morado.



PÚRPURA:

Definición: La púrpura es una lesión cutánea que se produce cuando pequeños vasos sanguíneos se rompen y sangran bajo la piel. Las lesiones purpúricas son manchas de color rojo violáceo que no desaparecen al presionarlas. No blanqueable, elevada y palpable.

Características:

- Manchas o parches de color púrpura.
- Manchas planas que se ven rojas o moderadas en pieles claras, y marrones o negras en pieles oscuras.
- Manchas que pueden llegar a medir entre 4 y 10 mm de diámetro.



EQUIMOSIS:

Definición: La equimosis es una lesión cutánea que se caracteriza por una decoloración de la piel causada por la fuga de sangre. También se conoce como moretón. Son áreas más grandes de púrpura que no se blanquean.

Características:

- Manchas de color negro, azul, rojo o morado.
- Cambian de color a medida que sanan.
- La mayoría no necesita tratamiento.



Bibliografía

1. Bates guía de Exploración física e historia clínica. 13ª Edición. Lynn S. Bickley
2. Definición y características; de lesiones primaria.