



Mi Universidad

Lesiones Primarias

Dannia Gissela Díaz Díaz

2do Parcial

Propedéutica Semiológica y Diagnóstico Físico


Doctora: Karla Sofía López Gutierrez

Medicina Humana


4to Semestre, Grupo "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de abril del 2025

Mácula: Es una área plana circunscrita con cambio de coloración de la piel, mide menos de 1cm de diámetro.





Parche: Lesión plana circunscrita de más de 1cm de diámetro, puede ser hiperpigmentado, hipopigmentado, eritematoso, violáceo, no palpable al tacto.



Placa: Lesión elevada, sólida y plana con diámetro mayor a 1cm, superficie uniforme, puede ser eritematosa, escamosa, hiperpigmentada.




Nódulo: Lesión sólida, palpable y elevada, con un tamaño mayor a 0.5cm, firme al tacto, compromete la dermis y tejido subcutáneo; puede ser redondeado, ovalado, eritematoso, pigmentado o del color de la piel.




TRUST YOURSELF


Pústula: Lesión elevada superficial con material purulento, se eleva por encima de la superficie cutánea, menor a 1cm.



Vesícula: Lesión elevada y superficial, que contiene líquido claro (seroso), mide menos de 1cm de diámetro, tiene pared delgada, se encuentra en la dermis o en epidermis, puede ser única, o múltiple, agrupada o dispersa.



Ampolla: Lesión elevada superficial, que contiene líquido claro o seroso, mide más de 1cm de diámetro.




Habón: Lesión cutánea transitoria elevada y edematosa, causado por la acumulación de líq. en la dermis, genera picazón intensa. Presenta un centro pálido rodeado por halo eritematoso o rojizo.




TRUST YOURSELF

Erosiones: Lesión que se define por la pérdida superficial de la epidermis, solo afecta la capa externa de la piel; borde irregular, puede presentar exudado mínimo o estar cubierta de costra en formación.



Úlcera: Lesión cutánea o mucosa, caracterizada por la pérdida completa de la epidermis, y en ocasiones, la dermis; márgenes definidos o difusos, al fondo puede aparecer tejido de granulación, puede haber exudado, son dolorosas, de reparación lenta, puede dejar cicatrices; en algunos casos se observa la presencia de tejido necrótico o costras en la

periferia.



Petequias: Lesiones puntiformes redondas, de color rojo o púrpura, resultan de pequeñas hemorragias; tiene un diámetro menor de 2mm, son lesiones planas, indoleras, aparecen de forma diseminada o en grupos.



Púrpura: Lesión cutánea o mucosa de color rojo violáceo, producido por hemorragia extravascular, su tama-

no varía entre 2mm y 1cm, forma irregular, redondeada u ovalada, no es dolorosa, puede aparecer en piel, mucosas o conjuntivas.



Esquimosis: Colección de sangre extravasada en la piel o mucosas, aparecen como una mancha de color violáceo o negroza, tamaño mayor de 1cm de diámetro, forma irregular, no es elevada, causada por la ruptura de vasos sanguíneos.



DREAM • BELIEVE • ACHIEVE