

Josué Alejandro Roblero Díaz

Dr. Luis Fernando Márquez Anzueto

**Cuadro Comparativo de la depresión
mayor/Trastorno depresivo.**

Psiquiatría

PASIÓN POR EDUCAR

5°

A

CUADRO COMPARATIVO

DEPRESION MAYOR/TRASTORNO DEPRESIVO.



Características clínicas	Depresión Mayor	Tras. Depresivo.
Definición	Se define como un trastorno afectivo crónico que persiste por lo menos con causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades.	Se define como un trastorno afectivo crónico que persiste por lo menos dos años en adultos y un año en adolescentes y niños.
Antecedentes familiares	 Frecuentes	 Menos Frecuente.
Inicio	Brusco	Insidioso.
Edad de inicio	Edad adulta	Desde la infancia
Curso	Fásico	Crónico
Gravedad	Más grave	Menos grave
Pronóstico	Menos favorable	Favorable.
Respuesta a tratamiento farmacológico	Buena	Variable
Duración de los síntomas para efectuar el diagnóstico	2 semanas	2 años
Tentativa suicida	Frecuente	*Puede haber ideas de muerte, pero raramente actúan





80124RTL30YAA1 80124R970
0Y122R970

	Depresion mayor	Trastorno Depresivo
signos predominantes	signos vegetativos y psicomotores: problemas de apetitivo, livido, retardo o asrtacion psicomotora.	signos cognitivos y emocionales: baja autoestima, anhedonia, fatiga y pobre concentracion.
caracteristicas compartidas	Humor depresivo, alteracion del sueño, disminucion de la energia, Pobre concentracion, Indecision.	
Tratamiento	* En la depresion leve-moderada se recomienda considerar un tratamiento psicologico breve 6 a 8 sesiones durante 10-12 semanas. * Los antidepresivos son farmacos dirigidos a mejorar los sintomas asociados a la depresion. * Los ISRS/inhibidores selectivos de la recaptacion de serotonina son los antidepresivos con mayor evidencia - Trancilpromina, citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, sertralina.	El tratamiento involucra una combinacion de medicamentos antidepresivos y con psicoterapia. - Paroxetina, fluoxetina, sertralina y Escitalopram



Bibliografía

Edmund, H. (2020). *Neurociencia en psiquiatría*. LWW.

IMSS. (2019). *Guía de Práctica Clínica de Trastorno de la Depresión*. 200.

