



Mi universidad  
Campus Comitán  
Lic. Medicina humana



Dr. Luis Fernando Márquez Anzueto.

Psiquiatría

**Mapa mental**

Mauricio Antonio Pérez Hernández

5ªA

## Tipicos

Antagonistas de receptores dopaminérgicos D2, (↓ Síntomas positivos de psicosis).

- Fenotiazinas: Clorpromazina
- Tioxantenos: Clorprotixeno
- Butirofenonas: Haloperidol
- Benzamidas: Sulpiride, Tiapride

## ATípicos

Antagonistas receptores D2 y 5-HT<sub>2A</sub>  
Síntomas positivos y negativos, ↓ efectos extrapiramidales.

- tínicos: Clozapina, Olanzapina
- tínicos: Risperidona, paliperidona
- típic: Aripiprazol.



## (ISRS)

- Citalopram
- Escitalopram
- Fluoxetina.

## Tricíclicos

• Recaptación 5-HT, NA, Inhiben Alfa-1-adrenérgicos, H1.

- Amoxapina
- Nortriptilina
- Imipramina



• IS Serotonina y Noradrenalina  
• Recaptación (5-HTA y NA)

- Venlafaxina
- Metabolitos Venlafaxina.



## Antipsicóticos

## Antidepresivos

## Estabilizadores del Humor

## Ansiolíticos / Hipnóticos

### Benzodiacepinas

Potencian acción del GABA en receptor GABA-A  
(↑ Entrada de cloro → Efecto Inhibitorio, Sedación, relajación).

- Diazepam
- Lorazepam
- Alprazolam
- Midazolam.



### No Benzodiacepinas

Actúan sobre receptor GABA-A de forma selectiva  
(Efecto sedante- Hipnótico, menor dependencia).

- Amitriptilina
- Imipramina
- Hidroxicina.



Medicamentos para  
Enfermedades  
Psiquiátricas

## Bibliografía

© Copyright 2021-2022 Joyas ENARM - Todos los derechos reservados.