



DR. ALAN DE JESUS MORALES DOMINGUEZ

ALONDRA YULIANA GONZALEZ GORDILLO

MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION

INFOGRAFIA "LESIONES ELEMENTALES DE LA PIEL"

5°A

PASIÓN POR EDUCAR

LESIONES CUTANEAS

QUE ES UNA LESION?

Se define como cualquier alteración visible o palpable en la estructura o coloración normal de la piel



LESIONES PRIMARIAS

Son aquellas que aparecen de forma directa como resultado inicial de un proceso patológico, sobre una piel previamente sana.



MACULA

Alteración circunscrita del color de la piel, sin elevación ni depresión.

< 1 cm de diámetro.

No es palpable, la textura de la piel se mantiene normal.

Puede ser hiperpigmentada, hipopigmentada, eritematosa o de otro color.



PAPULA

Lesión sólida, elevada y circunscrita, < 1 cm de diámetro.

Puede ser de origen epidérmico, dérmico o mixto. Puede presentar diferentes superficies: lisa, verrugosa, escamosa.

Ejemplos: liquen plano, verrugas, molusco contagioso



LESIONES CUTANEAS

LESIONES PRIMARIAS

NODULO TUBERCULOSO

Lesión sólida y palpable, >1 cm, afecta a capas más profundas de la dermis o hipodermis.

A menudo de consistencia firme, bien delimitado o difuso.

Puede ser inflamatorio o tumoral.



PLACA

Lesión sólida, elevada y plana, > 1 cm de diámetro. Resultado de la confluencia de múltiples pápulas o crecimiento radial de una sola.

Suelen tener superficie descamativa o queratósica.



GOMA

Lesión nodular, blanda y profunda, con necrosis central.

Evoluciona lentamente, puede ulcerarse y dejar cicatriz atrófica.

Indolora o poco dolorosa. Asociada a sífilis terciaria, tuberculosis cutánea, leishmaniasis.



LESIONES CUTANEAS

LESIONES PRIMARIAS

NUDOSIDAD

Nódulo inflamatorio profundo, firme y doloroso, mal delimitado.

No se ulcera, afecta tejido subcutáneo (panículo adiposo).

Común en piernas (cara anterior de las tibias).

Típica del eritema nodoso, asociado a infecciones, fármacos y enfermedades sistémicas.



LIQUIDO

VESICULA

Elevación circunscrita de la piel, de contenido líquido seroso; mide sólo unos cuantos milímetros, al romperse forma costras

POSTULA

Elevación pequeña, superficial, circunscrita, llena de líquido purulento; puede ser primaria (intraepidérmica o folicular) o secundaria a una vesícula



LESIONES CUTANEAS

LESIONES SECUNDARIAS

QUE SON?

Resultan de la evolución natural, manipulación, ruptura o infección de una lesión primaria. Pueden también reflejar fenómenos crónicos como el rascado persistente, la cicatrización, o el uso de tratamientos

COSTRAS

Formación resultante de la desecación de exudado (suero, sangre, pus) en la superficie cutánea. Pueden ser amarillentas, marrones o negras. Ejemplos: impétigo (costras melicéricas), eccema exudativo



ESCARAS

Zona de necrosis cutánea seca, dura y negruzca, de bordes bien definidos. Resulta de isquemia o destrucción tisular profunda, con pérdida total de las capas de la piel. Puede cubrir una úlcera subyacente.



LESIONES CUTANEAS

LESIONES SECUNDARIAS

EROSIONES

Pérdida superficial de la epidermis, sin sangrado. No deja cicatriz, pues no compromete la dermis.

Suelen resultar de la ruptura de vesículas o ampollas.

Ejemplo: erosiones por herpes simple, intertrigo



EXCORIACIONES

Erosión lineal o puntiforme, causada por rascado o fricción repetida.

Puede complicarse con infección secundaria. Ejemplo: dermatitis atópica, escabiosis.



ULCERACIONES

Pérdida más profunda que compromete epidermis y dermis, a menudo sangrante.

Cicatriza lentamente y deja cicatriz.

Ejemplo: úlceras venosas, pioderma gangrenoso, chancro sifilítico



LESIONES CUTANEAS

LESIONES SECUNDARIAS

GRIETAS Y FISURAS

Grieta lineal, dolorosa, que afecta epidermis y puede extenderse a dermis. Frecuente en áreas con movimiento o piel seca. Ejemplo: queilitis angular, talones resecos.



QUERATOSIS

Engrosamiento anormal de la capa córnea (estrato córneo) de la epidermis. Superficie áspera, seca o verrugosa. Puede ser asintomática o pruriginosa. Forma parte de lesiones primarias o secundarias, dependiendo de la causa.



ATROFIA

Adelgazamiento de la piel, pérdida de epidermis, dermis o tejido subcutáneo. Se observa piel fina, arrugada, translúcida. Ejemplos: atrofia por corticosteroides tópicos, lupus eritematoso crónico



LESIONES CUTANEAS

LESIONES SECUNDARIAS

ESCLEROSIS

Endurecimiento de la piel, debido a aumento de colágeno en dermis.

Piel brillante, tensa, con pérdida de elasticidad. Ejemplo: esclerodermia, morfea.



CICATRIZ

Formación de tejido conectivo fibroso que reemplaza a tejido normal destruido. Puede ser normotrófica, atrófica o hipertrófica/queloides. Ejemplo: cicatriz quirúrgica, acné cicatricial, queloides



LIQUENIFICACION

Engrosamiento de la piel con aumento de los pliegues cutáneos y acentuación de las líneas normales. Secundario a rascado crónico. Ejemplo: liquen simple crónico.



BIBLIOGRAFIA

