

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA**

Flashcards



Yarely Arlette Morales Santiz


5ºA

Clínica Quirúrgica


Dr. Jhovanny Efrain Farrera Valdiviezo

Comitán de Domínguez Chiapas a 9 de abril de 2025

Sierras quirúrgicas e instrumentos de corte




Maneras de usar el bisturí



- ### Tiempo de uso
- Cutsa estéril
 - Cutsa adhesiva
 - Cutsa no estéril
 - Cutsa para drenaje
 - Cutsa de clodón
 - Cutsa de malla
 - Cutsa hidrófila
 - Cutsa quirúrgica
 - Cutsa impermeable

Tijeras quirúrgicas



- ### Función en cirugía
- Viabilidad
 - Función
 - Estética

- ### Fases de cicatrización
- Hemostática - Cels. inflamatorias
 - Inflamación - Neógeno, necro, fibro. citados y otros
 - Proliferación - Fibroblastos migran quimiotaxis
 - Remodelación - Reducción de cicatrización

Sutura absorbible

Catgut simple	3-7-0
Catgut crómico	3-7-0
Acido poliglicólico	2 a 8-0
Poliglicolico 910	1 a 8-0/0-7
Polidioxanona	1 a 10-0
Poliglicolico	1 a 10-0
Poliglicolico	1 a 10-0

- ### Tijeras
- Tijeras rectas: corte de hilo
 - Anguladas: vasos sanguíneos
 - Tijeras curvas: corte de tejido
 - Bolón: corte de vendajes y telas

- ### Ceas de una línea
- Siete ceas
 - Piel, tejido subcutáneo, fascia, músculos abdominales, peritoneo
 - Útero, bolsa amniótica
 - Útero (Cervicario, miometrio, endometrio)

Características de absorción de sangre en vasos

Grasa de 10x10 = 60 ml
Grasa de 30x30 = 40 ml
Grasa simple = 5 ml


Como se anudan los vasos

- Anclas hemostáticas o anclas de Kelly
- Curvas o rectas

1. Tipos quirúrgicos

- Incisión, corte o diéresis
- Hemostática
- Exposición Coarctación, esplenectomía, histerectomía
- Discección
- Sutura o síntesis

Hojas de bisturí



Margen de bisturí y hoja de bisturí

3, 4, 7

Margen 3 hojas número 10-15

Margen 4 hojas número 20-25

Margen 7 hojas números enteros y estrechos

Anclas

Anclamiento para no lesionar el endotelio vascular, con lo cual el vaso se active transitoriamente

Suturas



Materiales de sutura


Tabla 5-4. Tiempo de absorción de los materiales de sutura

Catgut simple	10 días
Catgut crómico	20 días
Ácido poliglicólico	90 días
Polidilactina 910	90 días
Polyglactone 25	120 días
Polidioxanona	180 días
Polyglactato	180 días

Sutura no absorbible

Seda	Núm.
Algodón	5-10-0
Nylon	2-0 al 11-0
Polyester	5 al 6-0
Polypropileno	2 al 8-0
Polybutéster	1 al 6-0
Alambre	5 al 6-0
Polyetileno	2-0 al 6-0

Margen más usuales de bisturí



Anclas hemostáticas

