Nombre del Alumno: Juletzy Salas Gabriel

Parcial: 4to parcial

Tema: Flujograma

Nombre de la Materia: Salud pública

Nombre del profesor: Dra. Irma Sánchez Prieto

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

semestre: 2 A

DENGUE

Px: Alejando Fuentes de 4 años

1er nivel: centro de salud

Px pediatrico es llevado al centro de salud a consulta por que presenta Vómitos frecuentes, una fiebre de 40 ° C y sangrado de mucosas

Signos detectados en la consulta

Al llegar a consulta el médico general examina al niño e identifica que otros posibles síntomas tenga aparte con los que llegó.

- dolor abdominal
- signos de deshidratación severa
- Hipotensión

Equipo multidisciplinario

- médico general
- enfermera/o
- administrativo (recepción)

Manejo inmediato en el centro de salud

- control de vómito
- Solución salina

- al no tener el equipo necesario, el px es trasladado al hospital para tener un mejor control

Equipo multidisciplinario

- médico general
- enfermera/o
- Paramedicos

HOSPITAL

Fue transferido rápidamente al área de cuidados intensivos pediátricos, ahi nuevamente fue examinado por enfermería.

Al identificar todos los síntomas del px, se manda a hacer estudios de laboratorio:

- biometría hemática completa
- NS1
- IgM/IgG
- Electrolitos y función renal (por la deshidratación)

Equipo multidisciplinario

- médico de urgencias
- enfermera/o
- laboratorio clínico
- Pediatra

Manejo inmediato y control en el hospital

En los estudios que se le realizaron se detectó que el px presenta Dengue grave, una vez teniendo el Dx final se procederá con el tratamiento adecuado y estabilizar lo, para que no se complique más

- **<u>Administración de solución para tratar la deshidratación</u>**
- Hidratación con solución hartman o lactato
- monitoreo de signos vitales

una vez que se haya estabilizado al px y no presente ningún signo o que la fiebre ya haya bajado y q su estado general esté mejorando, es ingresado a la unidad de pediatría.

El pediatra analiza los estudios que se le realizaron al px y conforme a eso se le recomendará el tipo de alimentación para su estado con ayuda del nutriologo.

Equipo multidisciplinario

- Pediatra
- Infectologo pediátrico
- Nutriologo
- Laboratorista

Estabilización y monitoreo del paciente

- Monitoreo de los signos vitales cada 15-30 min

Equipo multidisciplinario

- Pediatra
- Nutriologo
- Trabajo social
- Farmacia

- Monitoreo diario de hidratación
- solo paracetamol
- Evitar AINES para no generar más sangrado y complicaciones en el px

Nutrición

El soporte nutricional hará que el px se recupere mejor con una buena alimentación.

- soporte oral
- Dieta progresiva

Se considerará el estado en el que se encuentra, como su peso, talla, IMC.

Se detectará si el px sufre de alguna enfermedad como: desnutrición o que se encuentre en bajo peso para su edad y conforme a eso

Educación nutricional

Para los padres es importante que estén al pendiente de la salud de su hijo y más en estos casos en los que sufren una enfermedad tienen que cuidar lo que comen y que sea adecuado para su pronta recuperación.

Se les enseña que tipo de alimentos deben de consumir para poder estimular el apetito del px, dado que en el dengue grave hay pérdida del apetito.

Alta

El paciente es dado de alta después de 48 hrs al ver que ya no hay ausencia de fiebre, su frecuencia cardiaca esté normal, ya no presenta Vómitos, se alimenta y que ya no presente sangrado.

Indicaciones para el alta:

- paracetamol si presenta molestias después
- dieta en frutas, verduras y proteínas
- Evitar alimentos grasosos

citas de control:

- citas regulares con el pediatra que le dió seguimiento y estuvo en su proceso de recuperación del px.

Equipo multidisciplinario

- Pediatra
- Nutriologo
- Trabajo social
- Farmacia
- Enfermería pediátrica

El paciente lleva una vida saludable y activa, en casa se mantuvo en reposo después de haberlo dado de alta del hospital, aún después va a sus citas con el pediatra y el nutriologo, los padres siguieron todo el plan de que se les dió.

- Trabajo social les implementó nuevas estrategias para prevenir otro caso como esté.