



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**MEDICINA HUMANA**

**SEMIOLOGIA**

**KAREN MICHELLE BOLAÑOS  
PERES**

**DANNA LOURDES RIVERA  
GASPAR**


**EXAMEN FISICO**



# EXAMEN FÍSICO

## Cabeza y cuello normal


- El espéculo se inserta con la mano izquierda en la narina, fijando su posición con el dedo índice, que se apoya en la fosa nasal observada.
- Se deben examinar las porciones superiores e inferiores de las fosas nasales, observando: 1) la mucosa (color y brillo), 2) el tabique nasal, y 3) los cornetes medio e inferior y el meato medio.




## BOCA

- El examen de los labios consiste en la evaluación de su forma, simetría y movilidad.
- La humedad se evalúa asimismo en los labios.
- Los dientes deben ser examinados en cuanto a su número y forma, efectuando una percusión liviana con el bajalengua o con el espejo, que debe ser indolora. También se observará la oclusión mandibular; la apertura bucal debe tener una amplitud similar al ancho de tres dedos del paciente.

- se solicita al paciente que protruya la lengua, evaluando tanto su superficie ventral como dorsal, observando su forma, tamaño, simetría y movilidad. La mucosa del dorso lingual presenta papilas fungiforme-filiformes.




## CUELLO



- El cuello se examina mediante la inspección, la palpación y la auscultación.
- Normalmente se deben identificar los músculos esternocleidomastoideos, escaleno y trapecio, la arteria carótida y el pulso venoso, y puede palpase la glándula tiroidea, y los cartílagos laríngeos y traqueales.

- Se observará la simetría del cuello y la presencia de latidos carotídeos y venosos. El pulso venoso se describe junto con la semiología cardiovascular, en tanto que el pulso carotídeo ya fue descrito con los signos vitales.

1. preauricular, por delante del trago;
2. tonsilares o amigdalinos, en el ángulo submandibular;
3. submaxilares, entre el ángulo submandibular y el mentón;
4. occipitales; en la parte posterior del cráneo;
5. retroauriculares, a nivel de la apófisis mastoideas;
6. cervicales superficiales, siguiendo la superficie del músculo esternocleidomastoideo, y profundos por debajo de él;
7. cadena cervical anterior, en el borde anterior del trapecio; y
8. supraclaviculares, entre el esternocleidomastoideo y la clavícula.



# BIBLIOGRAFIA

**file:///C:/Users/yessr/Desktop/Libros%20Danna/semiologia/Bates\_Gu%C3%ADa\_de\_Exploraci%C3%B3n\_F%C3%ADsica\_e\_Historia\_Cl%C3%ADnica\_13%C2%AA\_edici%C3%B3n.pdf**