



CATEDRATICO: CALDERON HERNANDEZ FRANCISCO

MATERIA: MEDICINA PALIATIVA

NOMBRE DEL TRABAJO: MAPA CONCEPTUAL DE CAUSAS DE CONSTIPACION

NOMBRE DEL ALUMNO: DEYLER ANTONI HERNANDEZ GUTIERREZ

CARRERA: MEDICINA HUMANA

SEMESTRE: 6TO SEMESTRE

FECHA DE ENTREGA: MIERCOLES 23 DE ABRIL DEL 2025

CAUSAS DE CONSTIPACION

CANCER COLORECTAL

La presencia de un tumor puede causar un estrechamiento intestinal.
El cancer puede afectar los nervios de la columna vertebral que conectan con los intestinos

CLINICA

Sangre oculta en heces
Heces mas estrechas
Dolor abdominal
Pérdida de peso
Tenesmo

MASAS INTESTINALES

La presencia de masas intestinales puede dificultar el paso de material fecal dificultando su defecacion

CLINICA

Perdida de peso
Falta de apetito
Nauseas
Vomitos
Dolor abdominal
Cambios en el control de la evacion

ESTENOSIS DE COLON

La estenosis de colon es una afeccion en la que una parte del colon se estrecha mas de lo normal

CLINICA

Dificultad para evacuar gases o heces
Inflamacion abdominal
Dolor y colicos abminal
Mal aliento

DIABETES MELLITUS

La hiperglucemia suelen causar estreñimiento al verse dañadas las terminaciones nerviosas del interior del intestino y, con ello, ocasionar una neuropatía, impidiendo la llegada de señales al músculo del órgano, no apareciendo las contracciones dinámicas de desalojo de las heces.

CLINICA

Poliuria, polidipsia, cansancio y falta de energía, pérdida de peso, polifagia o hiperfagia.
Visión borrosa.
Cicatrización lenta.
Infecciones frecuentes.

HIPOTIROIDISMO

En el hipotiroidismo, la motilidad intestinal puede disminuir, lo que puede provocar síntomas como estreñimiento.
Se suele considerar estreñimiento el tener menos de tres evacuaciones a la semana.

CLINICA

Cansancio, aumento de la sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca, aumento de peso, ronquedad de la voz, vello duro y piel áspera

E.R.C

La enfermedad renal crónica y el estado urémico se asocian con alteraciones en la permeabilidad intestinal y cambios en la microbiota intestinal, provocando una mayor producción y translocación de toxinas urémicas como sulfato de indoxilo (IS) y sulfato de p-cresilo (pCS), detonando una respuesta inflamatoria.

CLINICA

Creatinina elevada, proteinuria, albuminuria, Disminución de la producción de orina.
Edemas
Somnolencia,

PARKINSON

El sistema nervioso autonono en parkinson funciona de unqmanera mas lenta lo que puede provocar estreñimiento aunado al tratamiento farmacologico que puede contribuir.

CLINICA

Temblores, que comienzan en una extremidad, como la mano o los dedos, bradicinesia.
Rigidez muscular.
Deterioro de la postura y el equilibrio.
Pérdida de los movimientos automáticos.

CAUSAS DE CONSTIPACION

FISURAS ANALES

Tensión durante las evacuaciones
Las fisuras anales pueden causar constipación debido a la tensión durante las evacuaciones.

CLINICA

Dolor al defecar, (puede durar varias horas)
Sangre roja en las heces o el papel higiénico después de defecar.
Un pequeño bulto o acrocordón de la piel cerca de la fisura anal.

ESTENOSIS ANAL

Dificultad para evacuar
La estenosis anal puede causar constipación debido a la dificultad para evacuar. La rigidez y el estrechamiento del canal anal pueden provocar disfunciones al defecar

CLINICA

Dolor durante la evacuación, sangrado rectal, estreñimiento crónico, materia fecal acintada, ardor anal. Necesidad de hacer fuerza al evacuar los intestinos.
Pérdida de heces.

SII

El síndrome de intestino irritable es un trastorno intestinal funcional que causa dolor o molestia abdominal asociado con la defecación y/o cambios en los hábitos intestinales.

CLINICA

- Pérdida de peso.
- Diarrea nocturna.
- Sangrado rectal.
- Anemia por deficiencia de hierro.
- Vómitos inexplicables.
- Dolor que no se alivia expulsando gases o en la evacuación.

ESCLEROSIS MULTIPLE

La esclerosis múltiple puede causar constipación debido a la pérdida de mielina en el cerebro o la médula espinal, lo que afecta las señales gastrointestinales y la función intestinal normal

CLINICA

Pérdida de la visión en un ojo
Pérdida de la fuerza en un brazo o una pierna
Sensación de entumecimiento en las piernas
Espasmos y fatiga, depresión y problemas de incontinencia

ENFERMEDAD DE HIRSCHPRUNG

La enfermedad de Hirschsprung es un defecto congénito que implica la ausencia de células nerviosas en los músculos del intestino grueso. Esta ausencia de células nerviosas provoca estreñimiento grave u obstrucción intestinal.

CLINICA

Los síntomas incluyen estreñimiento crónico, distensión abdominal y vómitos.

DIETA

Baja ingesta de fibra

Rocío, G.-Z. K., & María, R.-T. J. (s/f). Constipación crónica. Conceptos actuales desde la fisiopatología hasta el tratamiento. Redalyc.org.
Recuperado el 24 de abril de 2025, de <https://www.redalyc.org/journal/1993/199366563004/199366563004.pdf>