



NOMBRE DEL ALUMNO: JOHANA ALEJANDRA MUÑOZ LAY

CARRERA: MEDICINA HUMANA.

ASIGNATURA: MEDICINA PALIATIVA.

DOCENTE: DR. CALDERON HERNANDEZ FRANCISCO

ACTIVIDAD: MAPA CONCEPTUAL

SEXTO SEMESTRE

GRUPO A

CAUSAS DE CONSTIPACION

TRÁNSITO COLONICO LENTO

Puede producirse como consecuencia de alteraciones metabólicas, endocrinas, enfermedades sistémicas, fármacos, pero también puede ser primario.

¿COMO PASA?

Al permanecer más tiempo el contenido intestinal en el colon se incrementa la absorción de agua y electrolitos, lo que endurece las heces.



DISFUNCIÓN DEL SUELO PELVICO

En este subtipo de estreñimiento, el tiempo de tránsito intestinal es normal.

¿COMO PASA?

Disminución de la sensibilidad rectal: con inhibición del deseo defecatorio.

Disinergia defecatoria




TRÁNSITO COLONICO NORMAL

Este subtipo probablemente sea la forma más común de estreñimiento que tratan los médicos de atención primaria

¿COMO PASA?

La frecuencia de defecación puede ser subjetivamente subestimada si no se lleva un diario específico en el que se controle el número de deposiciones semanales reales de los pacientes.



SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE

Es un trastorno funcional digestivo clínicamente caracterizado por la asociación de dolor abdominal, distensión y alteraciones en el hábito de deposición, ya sea diarrea o estreñimiento o alternancia de ambos

¿COMO PASA?

Se especula que mediante una microinflamación podría ser el origen de la hipersensibilidad de las terminaciones nerviosas de la pared intestinal que contribuye a inducir o perpetuar los síntomas, incluido el dolor abdominal.



Bibliografía

- Tratado de medicina geriátrica 2a Edición
- Por **Jonathan Gotfried**, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University. Revisado/Modificado may 2024