UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura
Medicina Humana

Materia
Medicina Paliativa.

Docente
Dr. Francisco Calderón Hernández.

Trabajo
Mapa conceptual de causas de constipación.

Estudiante
Kevin Jahir Kraul Borralles

Grado y grupo
6 semestre
Grupo “A”

Parcial 2

Tapachula, Chiapas

11 de Abril de 2025

Bibliografía

Tratado de medicina interna, 21 edición. Constipación.


CONSTIPACIÓN
Menos de 3 evacuaciones/semana, esfuerzo excesivo, heces duras, o sensación de evacuación incompleta.
Sindrome de intestino irritable SII-E
Alteraciones de la motilidad colónica y sensibilidad visceral aumentada → tránsito lento y percepción dolorosa de las heces.
HIPOTIROIDISMO
Disminución del metabolismo basal → hipomotilidad intestinal → retraso en el tránsito fecal.
DIABETES MELLITUS
Neuropatía autonómica (afecta plexos mientéricos) → pérdida del tono y coordinación peristáltica.
ENFERMEDAD DE PARKINSON
Degeneración de neuronas del sistema nervioso entérico → disminución de la motilidad colónica.
CANCER COLORRECTAL
Obstrucción parcial o completa del lumen intestinal por masa tumoral → bloqueo del tránsito de heces.
DEPRESIÓN
Disminución de serotonina central y periférica → enlentecimiento del tránsito gastrointestinal.
OBSTRUCCION INTESTINAL MECANICA (VOLVULO, HERNIAS, ADHERENCIAS)
Compresión física o torsión intestinal → detención del avance del contenido intestinal.
USO DE MEDICAMENTOS (OPIOIDES, ANTICOLINERGICOS, CALCIOANTAGONISTAS, HIERRO, ANTIPSICOTICOS)
Disminución del peristaltismo, aumento de absorción de agua colónica → endurecimiento de heces.
ESCLEROSIS MULTIPLE
Daño a vías neuronales autonómicas → alteración de reflejos de defecación y motilidad.
AMILOIDOSIS SISTEMICA
Depósito de amiloide en plexos intestinales → disfunción motora intestinal progresiva.
HIPERCALCEMIA
Aumento de la absorción de agua en intestino y disminución del tono muscular → tránsito lento.
ENFERMEDAD CELIACA
Inflamación crónica de mucosa intestinal → alteración funcional secundaria del tránsito.
ESCLERODERMIA
Fibrosis de la pared intestinal → pérdida de motilidad propulsiva y estasis de heces.