Mi Universidad

MAPA CONCEPTUAL

Nombre del alumno: García Penagos Daniela

Nombre del tema: Principales causas de constipación
Parcial: 2

Nombre de la materia: Medicina Paliativa

Nombre del profesor: Dr. Dr. Calderón Hernández Francisco

Nombre de la licenciatura: Medicina humana

Lugar y fecha de elaboración:
Tapachula, Chiapas 07 de abril de 2025


EVACUACIÓN INCOMPLETA , HECES DURAS Y NECESIDAD DE MANIOBRAS MANUALES
o también como
ESFUERZO, SENSACIÓN DE DIFICULTAD PARA EL PASO DE LAS HECES < 3 VECES/ SEMANA
se define como
PRINCIPALES CAUSAS DE CONSTIPACIÓN
CAMBIO EN EL CALIBRE DE LAS HECES
SANGRADO RECTAL
PROLAPSO RECTAL
PX > 50 AÑOS
SINTOMAS DE ALARMA
son
SINTOMAS OBSTRUCTIVOS
ADELGAZAMIENTO
HIRSCHSPRUNG
es una
ENFERMEDAD EN EL RECIÉN NACIDO
trastorno congenito
AUSENCIA DE LAS CÉLULAS NERVIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO ENTERICO
son
CÉLULAS GANGLIONARES
FALLA DE LA MIGRACIÓN DE LAS CÉLULAS
al colon distal
POR LO TANTO, NO HAY RELAJACIÓN Y SE OBSTRUYE
se
AFECTA EN UN 80% COLON RECTOSIGMOIDE
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
produce
ESTREÑIMIENTO
ocasionando
LA REDUCCIÓN DE LA EXCITABILIDAD NEUROMUSCULAR
a causa de
LOS ALTOS NIVELES DE CALCIO EN LA SANGRE (HIPERCALCEMIA)
su exceso
PUEDE PROVOCAR ATONÍA DEL MÚSCULO LISO
LOS MÚSCULOS NO FUNCIONAN DE FORMA ADECUADA
DISMINUCIÓN EN LA FRECUENCIA Y FACILIDAD DEL PASO DE LAS HECES
TRANSITO COLONICO LENTO
DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE CONTRACCIONES COLÓNICAS.
puede haber
ANOMALIAS EN LOS CIRCUITOS PERISTÁLTICOS
por alteraciones
CONTROL NEURAL PARASIMPÁTICO EXTRÍNSECO O ÉNTERICO
RETRASO DEL MOVIMIENTO DEL CONTENIDO INTRALUMINAL
a través del
COLON ASCENDENTE Y TRANSVERSO
ENFERMEDAD DE PARKINSON
se considera como un
TRASTORNO MOTOR QUE RESULTA DE LA PÉRDIDA DE NEURONAS DOPAMINERGICAS
desarrollando
DISFUNCIONES PRODRÓMICAS ALTERANDO LA MOTILIDAD GASTRICA
ante la falta de
DOPAMINA SE AFECTA EL CONTROL DEL MOVIMIENTO MUSCULAR
MÚSCULOS INTESTINALES PUEDEN VOLVERSE LENTOS, DESCOORDINADOS, INCAPACES DE CONTRAERSE
LOS PACIENTES TIENEN DIFICULTAD PARA MASTICAR Y NO CONSUMEN ALIMENTOS ALTOS EN FIBRA
DIABETES
los
NIVELES ALTOS DE GLUCOSA PUEDEN PROVOCAR UNA NEUROPATÍA DIABETICA, DAÑO A LOS NERVIOS
se puede producir
ATONÍA DEL INTESTINO
INTERRUPCIÓN YA SEA PARCIAL O TOTAL DEL PASO DEL CONTENIDO
DISMINUCIÓN DE LA MOTILIDAD INTESTINAL
DEFECTO EN EL CONTROL NERVIOSO DEL MÚSCULO
HIPOTIROIDISMO
ocasiona
HIPOMOTILIDAD INTESTINAL
DISMINUCIÓN DEL LOS MOVIMIENTOS INTESTINALES LO QUE FAVORECE EL ESTREÑIMIENTO
ya que
EL METABOLISMO SE VUELVE MÁS LENTO Y AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL
ESCLEROSIS SISTÉMICA
la
HIPOMOTILIDAD DEL COLON
a medida que la enfermedad avanza
CAUSA ALTERACIONES EN LA RELAJACIÓN Y RESTRICCIÓN EN LA DISTENSIÓN
puede ocasionar
RETRASO EN EL TIEMPO DEL TRÁNSITO INTESTINAL Y LLEVAR A LA CONSTIPACIÓN
el uso de
ANTIDIARREICOS PUEDEN EXACERBAR EL ESTREÑIMIENTO
E INDUCIR A UN PROLAPSO RECTAL

Bibliografía

S. A. P. D. M. (2017, 9 de enero). Enfermedad de Hirschsprung. https://doi.org/10.18233/apm1no1pp72-781325

A. G. L. (2021, 22 de marzo). Constipación Crónica. Sociedad Argentina de Gastroenterología. Recuperado el 22 de marzo de 2021, de https://www.redalyc.org/journal/1993/199366563004/199366563004.pdf

F. M. D. D. A. (2017, 17 de agosto). Estreñimiento y Diabetes. Federación Mexicana De Diabetes, A.C https://fmdiabetes.org/problemas-gastrointestinales-y-diabetes/

N. H. D. C. (2021, 6 de marzo). Relación Parkinson y estreñimiento. https://neurologia.hospitaldeclinicas.uba.ar/relacion-parkinson-y-constipacion/