

Control Prenatal

DEFINICION

Conjunto de acciones que involucran una serie de visitas de parte de la embarazada a la institución de salud y la respectiva consulta médica

Nom-007-SSA2-2016

1ª consulta

• Entre las 6-8 Semanas

2ª consulta

• Entre 10-13.6 Semanas.

3ª consulta

• Entre 16-18 semanas.

4ª consulta

• 22 semanas

5ª consulta

• 28 semanas

6ª consulta

• 32 semanas

7ª consulta

• 36 semanas

8ª consulta

• Entre 38-41 semanas.

- Mínimo cinco consultas prenatales iniciando preferentemente en las primeras 8 semanas de gestación.
- 10-12 consultas como ideal
- 1ª consulta 30-40 minutos
- 10 minutos 2ª consulta y posteriores

GPC

1ª consulta prenatal • <14 SOG

2ª consulta prenatal • 14 a 24 SOG

3ª consulta prenatal • 24 a 28 SOG

4ª consulta prenatal • 28 a 34 SOG

5ª consulta prenatal • 34 a 41 SOG

DIABETES GESTACIONAL

Diabetes pregestacional o preexistente
pacientes con diagnóstico previa de la
patología que se embarazaron o se diagnosticaron
durante el primer trimestre
Antes de las 13 SGA

Epidemiología

Diabetes en México

Se reporta en un 8.7-17%

Mujer Mexicana

mayor probabilidad de desarrollar DG por cuanto
pertenecen a un grupo étnico de alto riesgo
prevalencia

De todas las causas de diabetes en el
embarazo: 5-10% a nivel mundial

Mortalidad

Incremento de la mortalidad neonatal hasta
15 veces más

Consecuencias en hijos de madres diabéticas

Enfermedad coronaria

hipertensión arterial crónica

Dislipidemia

obesidad

Diabetes tipo 2

Las mujeres que desarrollaran diabetes
gestacional.

Tienen riesgo de desarrollar

DM2 en los 10 años posteriores al embarazo.

Factores de riesgo

- Edad materna > 30 años
- Historia familiar de diabetes
- Historia previa de DMG
- IMC > 30