Cuestionario 3er parcial

¿Cuál es la etiología más común de la faringoamigdalitis en niños?

- A) Virus Coxsackie
- B) ~~Streptococcus hemolítico del grupo A~~
- C) Staphylococcus aureus
- D) Mycoplasma pneumoniae

¿Cuál es el tratamiento de elección para una faringoamigdalitis por S. pyogenes?

- A) ~~Amoxicilina con ácido clavulánico~~
- B) Eritromicina
- C) Penicilina benzatínica
- D) Claritromicina

¿Cuál de los siguientes signos NO es característico de la faringoamigdalitis estreptocócica?

- A) Exudado amigdalino
- B) ~~Faringoedema~~
- C) Fiebre
- D) Adenopatía cervical dolorosa

Un niño de 7 años con fiebre alta, odinofagia, exudado purulento en amígdalas y sin tos. ¿Cuál sería la mejor estrategia diagnóstica?

- A) ~~Cultivo faríngeo~~
- B) Serología para EBV
- C) Prueba rápida de antígeno para estreptococo
- D) Radiografía de cuello

¿Cuál es una complicación supurativa de la faringoamigdalitis estreptocócica?

A) ~~Streptococcus pyogenes~~

B) Fiebre reumática

C) Absceso periamigdalino

D) Eritema marginado

¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de otitis media aguda?

A) ~~Streptococcus pneumoniae~~

B) Moraxella catarrhalis

C) Streptococcus pneumoniae

D) Staphylococcus aureus

En un niño de 2 años con otalgia, fiebre, y membrana timpánica abombada, ¿qué tratamiento inicial se recomienda?

A) Macrólidos

B) ~~Amoxicilina~~

C) Clindamicina

D) Antivirales

¿Cuál de los siguientes hallazgos indica perforación timpánica en otitis media?

A) ~~Impedancia~~

B) Dolor intenso

C) Otorragia

D) Otorrea purulenta

¿Qué conducta está indicada en un niño de 18 meses con otitis media bilateral y fiebre de 39°C?

A) ~~Observación por 48 horas~~

B) Inicio de antibióticos

C) Drenaje timpánico

D) Analgésicos únicamente

¿Qué vacuna ha demostrado disminuir la incidencia de OMA por su agente más frecuente?

- A) Vacuna contra H. influenzae tipo b
- B) Vacuna antineumocócica conjugada
- C) Vacuna contra la influenza
- D) Vacuna tríplice

¿Cuándo se sospecha una sinusitis bacteriana?

- A) Síntomas por más de 5 días
- B) Presencia de rinorrea transparente
- C) Persistencia de síntomas por más de 10 días sin mejoría
- D) Tos seca nocturna

¿Cuál es el antibiótico de primera elección en sinusitis bacteriana aguda?

- A) Azitromicina
- B) Amoxicilina
- C) Ceftriaxona
- D) Levofloxacino

¿Qué hallazgo clínico es más sugestivo de sinusitis etmoidal en niños?

- A) Dolor retro-orbitario
- B) Dolor y edema periorbitario

- C) Dolor maxilar unilateral
- D) Epistaxis

En un niño con sinusitis recurrente, ¿qué estudio de imagen se solicita para valorar complicaciones?

- A) Radiografía de senos paranasales
- B) Tomografía computada
- C) Resonancia magnética
- D) Ecografía nasal

Una complicación orbital de la sinusitis aguda es:

- A) Mastoiditis
- B) Celulitis preseptal
- C) Absceso pulmonar
- D) Bronquiolitis

El agente más frecuente de laringotraqueítis viral (crup) es:

- A) Haemophilus influenzae tipo b
- B) Parainfluenza virus
- C) Adenovirus
- D) Streptococcus pneumoniae

¿Cuál es el tratamiento de elección para un caso moderado de crup?

- A) Antibióticos

B) Adrenalina nebulada y dexametasona

C) Antihistamínicos

D) Oxígeno a alto flujo

¿Qué hallazgo radiográfico es típico del crup?

A) Signo del “cuello estrecho”

B) Signo del “reloj de arena”

C) Signo del “pico de loro”

D) Signo del “campanario”

¿Qué cuadro clínico sugiere epiglotitis más que crup?

A) Tos perruna

B) Escandor inspiratorio

C) Babeo, posición en trípode y disfagia

D) Rinorrea

¿Cuál es la principal complicación que se busca evitar en la epiglotitis?

A) Neumonía

B) Laringoespasmo

C) Obstrucción de la vía aérea

D) Bronquitis

¿Cuál de los siguientes signos vitales indica un mayor riesgo de complicaciones en IRA?

- A) Temperatura de 37.8°C
- B) Frecuencia respiratoria > 60 rpm en reposo
- C) Saturación de oxígeno del 95%
- D) Frecuencia cardíaca de 100 lpm

¿Qué signo clínico es más útil para diferenciar entre una faringitis viral y una bacteriana?

- A) Fiebre
- B) Otorragia
- C) Tos

¿Cuál es la complicación más temida de una otitis media no tratada?

- A) Meningitis
- B) Escalofrío
- C) Faringitis
- D) Pericarditis

Un niño de 5 años presenta fiebre, otalgia y otorrea purulenta. ¿Cuál es la fase de la otitis media que presenta?

- A) Fase de congestión
- B) Fase de exudación
- C) Fase de supuración
- D) Fase de resolución

¿Qué antibiótico se recomienda en niños con sinusitis que no responden a amoxicilina en 72 horas?

- A) Claritromicina
- B) Amoxicilina/ácido clavulánico
- ~~C) Claritromicina~~
- D) Cefalexina

¿Qué patrón espirométrico es característico de una enfermedad obstructiva?

- A) FVC disminuida, FEV₁ disminuida proporcional, FEV₁/FVC normal
- ~~B) FVC normal, FEV₁ muy disminuida, FEV₁/FVC < 0.7~~
- C) FVC y FEV₁ normales, FEV₁/FVC > 0.8
- D) FVC muy disminuida, FEV₁ ligeramente aumentada, FEV₁/FVC > 0.9

¿Cuál es la característica histopatológica clave del enfisema?

- ~~A) Fibrosis intersticial~~
- B) Destrucción de tabiques alveolares
- C) Presencia de eosinófilos
- D) Engrosamiento septal

¿Cuál es el principal desencadenante ambiental del enfisema centroacinar?

- A) Contaminación ambiental
- ~~B) Exposición a gases tóxicos~~
- C) Tabaquismo
- D) Infecciones bacterianas recurrentes

¿Qué tipo de enfisema está relacionado con deficiencia de alfa-1-antitripsina?

- A) Paraseptal
- B) Centroacinar
- C) Panacinar
- D) Irregular**

¿Cuál de las siguientes características distingue el asma de la EPOC?

- A) Patrón obstructivo
- B) Hiperreactividad bronquial reversible
- C) Presencia de bronquiectasias**
- D) Hipersecreción mucosa crónica

¿Cuál es el criterio esencial para el diagnóstico de SDRA?

- A) Fiebre persistente y disnea
- B) Hipoxemia con opacidades bilaterales sin causa cardiogénica
- C) Cianosis e hiperventilación
- D) Expectoración purulenta**

¿Cuál es la relación PaO_2/FiO_2 que define un SDRA severo?

- A) > 300 mmHg**
- B) 200–300 mmHg
- C) 100–200 mmHg
- D) < 100 mmHg

¿Cuál de las siguientes condiciones NO se considera causa frecuente de SDRA?

A) Sepsis

B) Asma grave

C) Asma grave

D) Aspiración gástrica

¿Qué fase histológica del SDRA se caracteriza por formación de membranas hialinas?

A) Fase exudativa

B) Fase proliferativa

C) Fase fibrótica

D) Fase de resolución

¿Cuál es el principal objetivo de la posición en prono en pacientes con SDRA?

A) Mejorar la perfusión renal

B) Facilitar la expectoración

C) Mejorar la oxigenación alveolar

D) Reducir la presión intracraneal

¿Cuál es el tipo de atelectasia asociado a tapones mucosos postoperatorios?

A) Por compresión

B) Por reabsorción

C) Por obstrucción

D) Irreversible

¿Qué característica distingue la atelectasia por contracción de otras formas?

- A) Es causada por neumotórax
- B) Es irreversible**
- C) Mejora con oxigenoterapia
- D) Se presenta en pacientes jóvenes

¿Cuál de las siguientes es una consecuencia fisiológica de la atelectasia?

- A) Hipercapnia con alcalosis
- B) Aumento del volumen pulmonar**
- C) Desequilibrio ventilación/perfusión con hipoxemia
- D) Hiperventilación compensatoria

Un paciente postquirúrgico presenta disnea y oximetría de 88%. Se ausculta disminución del murmullo vesicular en la base derecha. ¿Qué estudio solicitarías primero?

- A) Tomografía torácica
- B) Radiografía de tórax
- C) Broncoscopia**
- D) Gammagrafía pulmonar

En relación con el tratamiento de la atelectasia, ¿cuál es el objetivo primario?

- A) Suprimir la tos
- B) Prevenir la fiebre
- C) Prevenir infecciones**
- D) Administrar antibióticos de amplio espectro