

Cuestionario ,

Fisiopatología

unidad 2

**Docente , Doc.
Guillermo Del Solar
Villareal**

Trastornos Linfáticos y Leucocíticos

31. En la leucemia linfocítica crónica (LLC), ¿qué hallazgo es característico?

- a) ~~Leucocitosis con células blásticas~~
- b) Linfocitos pequeños y maduros con sombras de Gumprecht
- c) Presencia de bastones de Auer
- d) Aumento de plaquetas

32. ¿Cuál de los siguientes linfomas se asocia con la infección por el virus de Epstein-Barr?

- a) ~~Linfoma de Hodgkin~~
- b) Linfoma de Burkitt
- c) Linfoma de células del manto
- d) Linfoma folicular

33. ¿Cuál es el marcador tumoral característico del mieloma múltiple?

- a) ~~Proteína Bence-Jones en orina~~
- b) Aumento de plaquetas
- c) Hipocalcemia
- d) Disminución de inmunoglobulinas

34. ¿Qué manifestación clínica es típica en la leucemia mieloide aguda (LMA)?

- a) Pancitopenia con blastos en sangre periférica
- b) Linfocitosis persistente
- c) Esplenomegalia severa
- d) Leucocitosis con neutrofilia

35. En la leucemia mieloide crónica (LMC), ¿qué característica citogenética es diagnóstica?

- a) Mutación JAK2
- b) Cromosoma Filadelfia (t(9;22))
- c) Deleción en el gen p53
- d) Aumento de la expresión de CD19

Trastornos de la Hemostasia

36. ¿Cuál de las siguientes enfermedades de la coagulación se hereda con un patrón ligado al cromosoma X?

- a) Enfermedad de von Willebrand
- b) Púrpura trombocitopénica idiopática
- c) Hemofilia A
- d) Trombocitopenia inmune primaria

37. ¿Cuál de los siguientes trastornos de la coagulación se caracteriza por una deficiencia del factor VIII?

- a) Hemofilia A
- b) Hemofilia B
- c) Enfermedad de von Willebrand

~~d) Púrpura trombocitopénica trombótica~~

38. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es típico en la coagulación intravascular diseminada (CID)?

- a) Aumento del tiempo de protrombina y trombocitopenia
- b) ~~Aumento de fibrinógeno y plaquetas~~
- c) Disminución del dímero-D
- d) Aumento del hematocrito

39. ¿Qué prueba de laboratorio se usa para evaluar la vía extrínseca de la coagulación?

a) Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa)

~~b) Tiempo de protrombina (TP)~~

- c) Recuento de plaquetas
- d) Frotis de sangre periférica

40. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la púrpura trombocitopénica idiopática en adultos sintomáticos?

a) Antibióticos

b) Corticoides

c) Eritropoyetina

d) Hierro intravenoso