



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

NOMBRE DE ALUMNO:

EMILI VALERIA ROBLERO VELÁZQUEZ

NOMBRE DEL DOCENTE:

JOSUÉ VÁSQUEZ SUMOZA

PASIÓN POR EDUCAR

NOMBRE DEL TRABAJO:

INFOGRAFÍA "ETAPAS CLÍNICAS DEL

TRABAJO DE PARTO"

MATERIA:


GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

GRADO:

6TO SEMESTRE

TAPACHULA CHIAPAS A 11 DE ABRIL DEL 2025.

ETAPAS CLÍNICAS DEL TRABAJO DE PARTO



DILATACIÓN DE CUELLO UTERINO

- SEGMENTO UTERINOS:**



- interior: Blando, distendido, pasivo lo que produce

- Superior: Firme durante las contracciones



e: dilatació
o contracció

- conducto endocervical.

- # RESULTADO DE LA FUERZA D CINTURACIÓN

Dilatación completa: aproximado 10 cm

- A stylized illustration of a pregnant woman's belly, showing a baby inside. The background is pink.



Nulíparas: El nacimiento de la primera cabeza ocurre en la parte de la cabeza.

- nacimiento.



l nacimiento del  • Despu s de

- La separación placentaria se produce**



- a terminación se alcanza con la compresión y elevación alternada de los dedos.

La separación placentaria se produce


- La desproporción creada entre el tamaño placentario sin cambio.
 - El sitio de implantación reducido.



- La terminación se alcanza con la

compresión

- fondo uterino.



- Mecanismo de Schultze
- Mecanismos de Duncan.

Más información en:
Bibliografía

Williams (2010). **Psicología**. MC GRAW HILL.