Mi Universidad

Nombre del Alumno: Leticia Desiree Morales Aguilar

Nombre del tema: Sepsis materna

Nombre de la Materia: Ginecología y obstetricia

Nombre del profesor: Josue Vasquez Sumoza.

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Semestre: 5°

SEPSIS materna

Es una disfunción orgánica que amenaza la vida, resultante de una infección durante el embarazo, parto, puerperio o posterior a un aborto, que progresa rápidamente si no se detecta y trata a tiempo.

epidemiología etiología

- Representa hasta el 10.7% de las muertes maternas en el mundo.
- Es la tercera causa principal de muerte materna después de la hemorragia y la hipertensión.

Bacterias grampositivas:

- Staphylococcus aureus
- Streptococcus del grupo A (pyogenes)
- Streptococcus del grupo B

Bacterias gramnegativas:

- Escherichia coli (la más común)
- Klebsiella pneumoniae
- Pseudomonas aeruginosa

signos clínicos

- Fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ o hipotermia $< 36^{\circ}\text{C}$
- Frecuencia cardíaca > 100 lpm
- Frecuencia respiratoria > 20 rpm
- Presión arterial sistólica < 90 mmHg o PAM < 70 mmHg
- Alteración del estado mental
- Dolor abdominal, pélvico o uterino
- Flujo vaginal purulento o maloliente
- Infección de heridas (por ejemplo, cesárea o episiotomía)
- Retención de productos de la concepción
- Hipotonía uterina persistente

diagnóstico

- Hemocultivos antes de iniciar antibióticos
- Biometría hemática
- PCR elevada
- Lactato sérico aumentado (puede indicar hipoperfusión tisular)
- Pruebas de función renal y hepática
- Gasometría arterial o venosa
- USG pélvico/abdominal si se sospecha foco gineco-obstétrico
- Exámenes de orina y urocultivo

Evaluación de disfunción orgánica (SOFA modificado o qSOFA)

- Presión arterial
- Oxigenación ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)
- Estado de conciencia
- Función renal (creatinina)
- Coagulación (plaquetas)
- Bilirrubinas

qSOFA modificado para sepsis materna:

- Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm
- Estado mental alterado (Glasgow < 15)
- Presión arterial sistólica < 100 mmHg o $< 90/60$ mmHg

Tratamiento

Tratamiento inmediato - dentro de la primera hora (Golden Hour)

- Administrar antibióticos de amplio espectro dentro de la primera hora de haber identificado la sepsis.
- Tratamiento empírico, sin esperar resultados de laboratorio.

En casos de infección intraamniótica, la ACOG recomienda:

- Ampicilina 2 g IV cada 6 horas + Gentamicina 1.5 mg/kg IV cada 8 horas.
- En caso de alergia a penicilina: Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas + Gentamicina 5 mg/kg IV cada 24 horas.

Evaluar y tratar el foco primario: por ejemplo, infecciones uterinas, urinarias, heridas quirúrgicas.

- Puede incluir:
 - Drenaje de abscesos
 - Retiro de restos placentarios
 - Revisión uterina
 - Cirugía en casos necesarios

Tratamiento

Medidas de soporte hemodinámico

- Administrar líquidos intravenosos cristaloides de forma rápida (ej. 30 mL/kg en la primera hora)
- Uso de vasopresores si persiste hipotensión tras líquidos:
 - Noradrenalina como vasopresor de primera línea

Monitoreo y soporte adicional

- Oxigenoterapia para mantener saturación $\geq 94\%$
- Evaluación continua del estado clínico, diuresis, signos vitales
- Control de la glucosa (evitar hiperglucemia)

Bibliografía

- Prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis materna. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, CENETEC; 2018.