

## Cuestionario de enfermedades gastrointestinales

### 1. ¿Cuál es la definición de diarrea?

- A) Pérdida involuntaria de líquidos digestivos
- B) Más de tres deposiciones sólidas al día
- C) Incremento en la frecuencia y disminución en la consistencia de las deposiciones
- D) Presencia de moco y sangre en todas las deposiciones

### 2. ¿Cuándo se considera diarrea aguda?

- A) Duración menor a 7 días
- B) Duración mayor a 30 días
- C) Duración menor a 14 días
- D) Presencia de vómito

### 3. ¿Qué tipo de diarrea se presenta con sangre?

- A) Osmótica
- B) Secretora
- C) Disentería
- D) Malabsortiva

### 4. En países en desarrollo, ¿cuántos episodios de diarrea por año presentan en promedio los niños menores de 5 años?

- A) 1-2
- B) 2-3
- C) 3-5
- D) 5-7

### 5. ¿Cuál es la principal causa de desnutrición y muerte en niños pequeños en países en vías de desarrollo?

- A) Infecciones respiratorias
- B) Malaria
- C) Diarrea
- D) Deshidratación por fiebre

### 6. ¿Cuál es la causa más frecuente de diarrea?

- A) Parásitos
- B) Bacterias
- C) Virus

D) Toxinas

**7. ¿Qué porcentaje de diarreas son virales?**

- A) 10-20%
- B) 20-30%
- C) 50-60%
- D) 70-80%

**8. ¿Qué tipo de diarrea se caracteriza por la presencia de fiebre y sangre en heces?**

- A) Secretora
- B) Osmótica
- C) Inflamatoria
- D) Malabsortiva

**9. ¿Qué tipo de diarrea mejora con el ayuno?**

- A) Secretora
- B) Inflamatoria
- C) Osmótica
- D) Motilidad alterada

**10. ¿Qué tipo de diarrea presenta heces en gran volumen, sin productos patológicos, y no mejora con el ayuno?**

- A) Osmótica
- B) Inflamatoria
- C) Secretora
- D) Malabsortiva

**11. ¿Cuál de las siguientes se caracteriza por esteatorrea y déficit nutricional?**

- A) Diarrea secretora
- B) Diarrea inflamatoria
- C) Diarrea malabsortiva
- D) Diarrea osmótica

**12. ¿Qué mecanismo se altera en la diarrea por hipertiroidismo o gastrectomía?**

- A) Secreción
- B) Absorción
- C) Motilidad
- D) Osmolaridad

**13. ¿Qué virus es la causa más importante de diarrea grave en niños menores de 5 años?**

- A) Adenovirus
- B) Norovirus
- C) Rotavirus
- D) Astrovirus

**14. ¿Qué tipo de transmisión es más común en rotavirus?**

- A) Transfusión sanguínea
- B) Ingesta de alimentos grasos
- C) Feco-oral y respiratoria
- D) Contacto dérmico

**15. ¿Cuál es el período de incubación del rotavirus?**

- A) 12 horas
- B) 24 horas
- C) 48 horas
- D) 72 horas

**16. ¿Qué tipo de rotavirus afecta más a lactantes desnutridos causando diarrea grave y mortal?**

- A) Tipo A
- B) Tipo B
- C) Tipo C
- D) Tipo D

**17. ¿Qué agente viral puede causar enterocolitis necrosante en lactantes?**

- A) Norovirus
- B) Coronavirus
- C) Adenovirus
- D) CMV

**18. ¿Cuál de las siguientes bacterias es invasiva?**

- A) E. coli enterotoxigénica
- B) Vibrio cholerae
- C) Salmonella
- D) S. aureus

**19. ¿Cuál de las siguientes toxinas produce diarrea tipo “agua de arroz”?**

- A) Toxina de Shigella
- B) **Toxina de Vibrio cholerae**
- C) Toxina botulínica
- D) Toxina de S. aureus

**20. ¿Qué agente parasitario produce diarrea pastosa, esteatorrea y dolor postprandial?**

- A) Entamoeba histolytica
- B) **Giardia lamblia**
- C) Ascaris lumbricoides
- D) Trichuris trichiura

**21. ¿Qué protozoo tiene formas de trofozoíto y quiste?**

- A) Entamoeba histolytica
- B) Isospora belli
- C) **Giardia lamblia**
- D) Blastocystis hominis

**22. ¿Qué bacteria tiene capacidad de sobrevivir en macrófagos?**

- A) Shigella
- B) Campylobacter
- C) **Salmonella**
- D) Vibrio

**23. ¿Cuál de las siguientes condiciones se asocia a Entamoeba histolytica?**

- A) Enterocolitis necrosante
- B) **Ameboma**
- C) Megacolon tóxico
- D) Ileitis terminal

**24. ¿Qué agente parasitario puede causar colitis fulminante?**

- A) Cryptosporidium
- B) **Entamoeba histolytica**
- C) Giardia lamblia
- D) Trichinella spiralis

**25. ¿Cuál no es un factor predisponente de diarrea?**

- A) Desnutrición
- B) Uso de biberones
- C) Fiebre tifoidea
- D) Mala higiene

**26. ¿Cuál es un signo de diarrea de origen funcional?**

- A) Esteatorrea
- B) Fiebre
- C) Respeto al sueño nocturno
- D) Sangre en heces

**27. ¿Qué hallazgo en heces sugiere malabsorción?**

- A) Sangre
- B) Moco
- C) Grasa visible
- D) Bacterias

**28. ¿Qué examen se usa para detectar Giardia?**

- A) Coprocultivo
- B) Examen en fresco de heces
- C) Tinción de Gram
- D) Electroforesis de proteínas

**29. ¿Qué prueba rápida se usa para rotavirus?**

- A) PCR
- B) Serología
- C) Prueba de látex
- D) Coprocultivo

**30. ¿Qué electrolito suele perderse en diarrea secretora?**

- A) Calcio
- B) Potasio
- C) Sodio
- D) Cloro

**31. ¿Cuál de los siguientes medicamentos actúa sobre encefalinas intestinales?**

- A) Loperamida

- B) Racecadotril
- C) Probióticos
- D) Omeprazol

32. ¿Qué medicamento no se recomienda por toxicidad?

- A) Salicilato de bismuto
- B) Metronidazol
- C) Albendazol
- D) Ciprofloxacina

33. ¿Cuál es el tratamiento para giardiasis en niños?

- A) Amoxicilina
- B) Metronidazol
- C) Claritromicina
- D) Ceftriaxona

34. ¿Qué antibiótico se usa para cólera?

- A) Azitromicina
- B) Furazolidona
- C) Doxiciclina
- D) B y C

35. ¿Cuál es el antibiótico de elección en amebiasis severa?

- A) Ciprofloxacina
- B) Dihidroemetina
- C) Ceftriaxona
- D) Furazolidona

36. ¿Qué fármaco se recomienda en diarrea disenteriforme por *Shigella* en inmunodeprimidos?

- A) Ciprofloxacina
- B) Azitromicina
- C) Ceftriaxona
- D) Todas las anteriores

37. ¿Cuál es un probiótico recomendado para reconstituir la flora intestinal?

- A) Perenteryl (*Saccharomyces boulardii*)
- B) Cloranfenicol

- C) Omeprazol
- D) Rifaximina

**38. ¿Cuál de los siguientes NO es una bacteria formadora de toxinas?**

- A) *C. botulinum*
- B) *B. cereus*
- C) *E. coli* ECEH
- D) *Giardia lamblia*

**39. ¿Qué examen permite identificar *Campylobacter*?**

- A) Azul de metileno
- B) Coprocultivo
- C) Tinción de Gram
- D) PCR

**40. ¿Qué tratamiento se indica en diarreas bacterianas por *Giardia* y *Shigella*?**

- A) Furazolidona
- B) Loperamida
- C) Paracetamol
- D) Ibuprofeno