UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura

Medicina Humana

Materia

Inmunología.

Docente

Dr. Guillermo del solar Villarreal.

Trabajo

Infografía de enfermedades respiratorias.

Estudiante

Kevin Jahir Kraul Borrallés

Grado y grupo

6 semestre

Grupo "A"

Parcial 3

Tapachula, Chiapas

29 de mayo de 2025

Faringoamigdalitis Bacteriana

Y viral

Definición

Infección aguda de la faringe y amígdalas causada por bacterias, principalmente *Streptococcus pyogenes* (estreptococo β -hemolítico del grupo A). Se caracteriza por inflamación purulenta, fiebre elevada y dolor faríngeo intenso.

Infección de la faringe y amígdalas por virus respiratorios. Es la causa más común de faringitis, especialmente en niños pequeños. Suele acompañarse de síntomas catarrales y tiene curso autolimitado.

Etiología.

Viral:

Los virus más comunes que causan faringoamigdalitis son el rinovirus, adenovirus, virus influenza, coronavirus, virus respiratorio sincitial, entre otros. También pueden estar involucrados virus como el de Epstein-Barr, el herpes simple, el citomegalovirus y el VIH.

Bacteriano:

La bacteria más común que causa faringoamigdalitis es el EBHGA (*Streptococcus pyogenes*). Otras bacterias menos comunes pueden ser *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Fusobacterium*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Neisseria gonorrhoeae*, entre otras.

Factores de riesgo.

- Tabaquismo y exposición al humo de tabaco.
- Contacto con pacientes con faringoamigdalitis o con portadores asintomáticos de *Streptococcus beta-hemolítico del Grupo A* (EBHGA).
- Antecedente de haber padecido reflujo gastroesofágico.

Recomendaciones.

- Utilización de cubre bocas.
- Evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura.
 - Inmunodepresión.
 - Exposición a clima artificial.
- Actividad laboral relacionada con el uso de la voz.

Diagnóstico.

El diagnóstico de faringoamigdalitis aguda es clínico.

Un 90% de los casos de faringoamigdalitis aguda en los adultos es de etiología viral y los síntomas característicos son: odinofagia, tos, coriza, conjuntivitis y úlceras faríngeas.

Los casos ocasionados por bacterias se caracterizan por la presencia de fiebre, odinofagia, adenopatía cervical anterior, exudado purulento y ausencia de tos.

Faringoamigdalitis viral.

El tratamiento es inicialmente sintomático durante los primeros tres días

- Paracetamol 500mg VO cada 8hs de 3 a 5 días ó
- Naproxeno 250 mg vía oral cada 12 horas de 3 a 5 días

Tratamiento.

Faringoamigdalitis bacteriana.

- Amoxicilina ácido clavulánico 500 mg c/8 hrs. 10 días
- Cefalosporina de primera generación 10 días
 - Eritromicina 500 mg vía oral cada 6 horas por 10 días ó
 - Trimetoprima sulfametoxazol tabletas de 80/400 mg, 2 tabletas vía oral cada 12 hrs. por 10 días.

bibliografía

- Apuntes hechos en clases.
- Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico y Tratamiento de Faringoamigdalitis Aguda