



Mi Universidad

Infografía

Nombre del alumno: García Penagos Daniela

**Nombre del tema: Neuralgia del Trigémino
Parcial: 3**

Nombre de la materia: Neurología

**Nombre del profesor: Dr. González Méndez Luis
Antonio**

Nombre de la licenciatura: Medicina humana

**Lugar y fecha de elaboración:
Tapachula, Chiapas 24 de mayo de 2025**

NEURALGIA DEL TRIGEMINO

CARACTERISTICAS


Es un síndrome doloroso de la cara, de dolor tipo lancinante

- Unilateral
- De presentación súbita
- Se afecta 2° y 3° rama del trigémino

ESTRUCTURA DEL NERVI

Sensitivo

N. Oftálmico
N. Maxilar
N. Mandibular



Motor

M. Masetero
M. Pterigoideo
M. Masticación

CAUSAS

La enfermedad ataca normalmente en la edad adulta, también como un proceso normal de envejecimiento.



Puede ser causada por, esclerosis múltiple o también a causa de un tumor o vaso hinchado ya que ejerce presión sobre el nervio.



EPIDEMIOLOGIA

- Constituye el 89% de las algias faciales
- Suele desarrollarse en un 70% después de los 40 años
- Más frecuente en mujeres
- Es más afectado el lado derecho que el izquierdo



SINTOMAS

- Crisis dolorosas
- Dolor neuropático (quemante)
- El dolor se puede ocasionar por: beber, masticar, etc.



CUADRO CLINICO

- Dolor intenso.
- Tipo eléctrico, lancinante.
- Comienzo paroxístico, duración de segundos o minutos.



DIAGNOSTICO

Pruebas de reflejo del trigémino
Pruebas de glucosa
Resonancia magnética



El examen puede mostrar:

- Sensibilidad anormal en la piel
- Problemas de reflejos
- Pérdida de la masa muscular

TRATAMIENTO



Farmacológico:
Carbamazepina 200-1200 mg/día
Oxcarbazepina 600 mg/día
2° Línea
Paracetamol + AINE + Opiáceo fuerte



Quirúrgico
Se puede recomendar la cirugía, para aliviar la presión sobre el nervio como para dañarlo selectivamente

Bibliografía

Apuntes de clase
Neurología

Tratamiento farmacológico del dolor neuropático en
mayores de 18 años. México: Instituto Mexicano del
Seguro Social, 2011

441GRR