



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA HUMANA 8VO SEMESTRE

PRESENTA:

ERICK VILLEGAS MARTINEZ

DOCENTE:

DR. LUIS ANTONIO GONZALEZ MENDEZ

MATERIA:

MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

COLECISTITIS

Es la inflamación de la vesícula biliar, generalmente causada por obstrucción del conducto cístico por cálculos biliares




Causas

- Cálculos biliares (90% de los casos).
- Barro biliar o, en raras ocasiones, sin obstrucción evidente.

FACTORES DE RIESGO

- Edad mayor de 40 años.
- Sexo femenino
-  Obesidad y pérdida rápida de peso



- Embarazo
- Historia familiar de litiasis biliar.
- Diabetes mellitus

CLÍNICA

- **Síntomas clásicos**
- **1** Dolor en hipocondrio derecho, irradiado al hombro derecho.
- **2** Signo de Murphy positivo.
- **3** Fiebre (puede ser $>39^{\circ}\text{C}$ en casos complicados).
- Náusea y vómito.



Diagnóstico

Imagenología:

- Ultrasonido abdominal ✓
- Gammagrafía hepatobiliar
- TAC y RMN – complicados.

-  **Clínico: Dolor, fiebre, signo de Murphy.**
- **Laboratorio:**
 - Leucocitosis.
 - PCR elevada.
 - Bilirrubinas, creatinina, amilasa (para detectar complicaciones)

Tratamiento Médico

- Ayuno, hidratación intravenosa, analgésicos
- Antibióticos según gravedad:

Quirúrgico

- Colecistectomía laparoscópica temprana es el tratamiento de elección.
- En casos graves o si hay complicaciones (abscesos, gangrena), puede requerirse drenaje percutáneo o colecistectomía diferida.