

Marvin López Roblero



6°

"B"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 30 de mayo del 2024.

VASCULAR Alteración cognitiva causada por enfermedad vascular recausada por problemas en el Fluio sanguineo al cerebro, lo que afecta a la . 23 mm por 10 min - Enfermedad gran vaso · 63 mm - Enfermedad pequeño vaso Epidemiologia rsegunda causa mas frewente de demencia NPredominante en Oriente Asiatico NAITA prevalencia de 275 años C1.20. ca « Afección de funciones escutivas » Desorientación ~ Afección al vazonamiento « Problemas en la memon « Afecta la planificación « Marcha inestable Diagnostico ~ Moca ezo pt ~ Evaluación funcional : Al VOI AVO ~ Clinica Estudios de imagen - RM (Elección) = microhemorragias, Atrofia cortical Tratamiento sintomatico Inhibidores de la colinesterasa Donepezilo galantamica Rivastismina Preventiva Dieta mediterraneo - Disminución del riesso de FA - Control de slucosa y TA 2120 mm Hg. Evitar + abaquismo Frontoterporal Demencia progresiva que afecta principalmente a los lobulos frontal y temporal del cerebro, responsables de funciones como la persona lidad, comporta miento, emociones. Epidemiologia Ntrevalencia 15-22 casos/100,000 habitantes Nfrewencia-mayor en hombres nsegunda causa en adolfos jovenes Mas Frewente e65 años clinica ~ Cambios en la personalidad ~ Cambios en la conducta ~ Apatia « Comprensión de palabras alteradas « Repetición de palabras ~ falla es nominación * No fluente agramatica: a Habla dificultosa a Aprana del habla * logo perica ~ Repetición de oraciones alterada N'esperiorios fonologicas N'emprensión de palabras conservada Tratamiento · Antidepresivos - sertalina, fluvoxamina · Antipsicoticos - Olanzapina , evetiopina , valoroato

Parkinson

Proceso neuro degenerativo compleio de apanición en la edad adulta, se caracteriza por la perdida progresiva de neuronas dopaninergicas

a Prevalencia del 0.3% en población general

N Prevalencia del 11. en 260 años

100,000 habitantes lano n hoidencia estimada de 8-18 por n 1.5-2 veces mayor en hombres

n segunda entermedad neuro degenerativa mas frewente detros del Alzheimer

Clinica

N Temblor en reposo Nerdida de memoria

NAcinesia NTransformos del sueño

~ Fatigabilidad ~ Canson co

· Depresión · Ansiedad · Alvanaciones

Diagnostico

~ Diagnostico clinico ~ Escalo de Hoehn y Yahr

NPET ISPCET ~ Mos

1-1 Sintomas minimos = Afectan 1 parte del werpo · Estadio

2-7 Afecta ambas partes, sin alteración del equilibrio · Estadio

3-7 Discapacidad leve · Es fadio

· Estadio 4-> Discapacidad severa

5-7 Continado a coma/silla de ruedas · Estadio

TOTTERM. STO ~ Doneperilo -> 5 mg por 4 semanas NRIVERTIGNING -> 1.5 Mg por 4 semanas 2 veces /dia NMamantina -> 2 veces Idía 5 mg por 1 sem hasta alconzar dosis de 20 Mg

Demencia por werpos de Lewy Es el trastorno del cerebro que afecta el pensamiento, movimiento y otras afecciones corporales, causada por la acumulación de depositos de proteina alfa-simulaina (cuerpos de Lewr) Clinica tuse producine 1 Deterioro cognitivo - Flochaciones en la atención y cognición 2º Sintomas conductuales - Alvanaciones visuales - Deterioro de la meuro 3º Fenomenos del suero - Movimientos ou lares rapidos 4º Disminición cutonomica - Caida postural en la presión A 5º Sintomas lisicos - Parkinsonismo, temblores mixtos hiposmia fase Demensia a Dificultad en la commicación a Problemas de multitareas a Parkinsonismo Noveros my vividos nhasgos psicoactivos a Deterioro cognitivo fluctuante a Trastornos del sueño Diagnostico El diagnostico es clínico uso de esculas: Alba Screening Instrument.

-17 Items dividido en 3 secciones

-Max 24 pts-prayor protaie = mejor diagnostica * Tomografic por emisión de positiones Tratamiento * Anticolines terasa * Garazepam -> P/ABO Par Priones Definición La demencia por priones es un grupo de enfermedades neuro degenera-tivas causadas por la acumulación de proteínas anormales en el Epidemialogia · Mexico-Incidencia achal no es conocida, pero se estima que existen Chanca El conienzo es con sintomas inespecíficos: NAlteraciones del sueño NAlteraciones del animo NIMITABILIDAD NERDIDA DESO N Convelsiones

Progresanti N Deterioro cognitivo N Deterioro de la conducta N Trastornos del MOV. como par parkinsonismo, mioclonicas o alteraciones de la marcha

Diagnostico NRM NESTUDIO de liquido cetalomaquideo Nelinico + Anamnesis

Tratamiento

* No tiene cura - sintometico - contro! Para el control de mioclonicas elonazepam y levetiracetam - Manejo de trastornos del sueño: - clonazepam